



دار الأزل للطباعة والنشر والتوزيع

النسخة

1 2024 د

CHEMISTRY

137 درجة

من اصل 140

1 2023 د

140 درجة

من اصل 142

للصف السادس العلمي

0 7 7 2 5 7 4 6 0 7 5

المراجعة المركزة

المراجعة المركزة الأفضل على مستوى العراق

2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عزيزي الطالب :

بعد النجاح الذي حققته المراجعة المركزة في الاعوام السبعة الماضية من 2018 ولغاية 2024 وحصولها على المركز الاول وبدرجة **لم تقل عن 95 درجة (عدا الترك)** ولكافة الادوار لداخل وخارج القطر والتمهيدي.

تأتي اليوم بحلتها الجديدة **(الطبعة الثامنة 2025)** وبترتيب وشمولية اكثر في انتقاء واختيار الاسئلة والمواضيع المناسبة للمراجعة ، وهي عبارة عن خلاصة للمواضيع وتوضيح الافكار وعدم تكرار الاسئلة المتشابهة ويمكن للطالب الاعتماد عليها في فترة المراجعة الثانية او ليلة الامتحان اما في المراجعة الاولى فيفضل الاعتماد على الكتاب المنهجي المقرر او على الملزمة النموذجية وان يقرأ المادة قراءة شاملة ، وهي تقدر بنسبة **34 % من الملزمة الاصلية (النموذجية في الكيمياء)**

ولا تعتبر المراجعة المركزة مرشحات للأسئلة ، **انما هي مرشحات للمواضيع والافكار** ، اي قد لا يأتي السؤال الوزاري نصاً لكن بنفس الفكرة مع تغير بالمطلوب او في الأرقام احياناً ، ولها النتائج التالية :

السادس العلمي					العام الدراسي
التمهيدي	الدور الاول	الدور الثاني	الدور الثالث	الدور 2 تكميلي	
100	94	95	98	--	2018
100	97	97	100	--	2019
100	100	100	100	--	2020
100	100	100	--	--	2021
100	100	100	--	100	2022
100	100	100		100	2023
100	100	100	100		2024

اهداء: الى معلمي الاول في الحياة والدي رحمة الله ، الى نبع الحنان والدي رحمها الله ، اهدي لهما ثواب جهدي المتواضع هذا وهو اقل العطاء والعرفان بحقهما



علم الثرموداينمك



هو علم يهتم بدراسة الطاقة وتحولاتها ويهدف نحو تحويل اكبر قدر ممكن من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود الى انواع اخرى من الطاقات .

سؤال



ماهي الظواهر التي يفسرها علم الثرموداينمك ؟

- 1 - سبب حدوث التفاعلات الكيميائية .
- 2 - التنبؤ بحدوث التغيرات الكيميائية والفيزيائية .
- 3 - حدوث بعض التفاعلات تلقائيا واخرى لا تحدث بشكل تلقائي وبنفس الظروف .
- 4 - سبب حدوث الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية .

سؤال



ماهي اقسام الطاقة الرئيسية ؟

- 1 - الطاقة الكامنة (المخزونة في جميع انواع الوقود)
- 2 - الطاقة الحركية (اي الطاقة في الاجسام المتحركة كالماء المتحرك) .

بعض المصطلحات الثرموداينمكية :

1 - النظام:



هو جزء معين من الكون نهتم بدراسته يتكون من المادة او المواد المشتركة في حدوث تغيرات فيزيائية وكيميائية .

2 - الحد :



وهي الحدود التخيلية او الحقيقية التي تفصل النظام عن المحيط .

3 - المحيط :



كل ما يحيط بالنظام ويؤثر عليه من تغيرات فيزيائية وكيميائية .

انواع الانظمة :

1 - النظام المفتوح :



وهو النظام الذي تسمح حدوده بتبادل مادة النظام وطاقته مع المحيط ، مثال اناء معدني مفتوح يحتوي على ماء مغلي .

2 - النظام المغلق :



وهو النظام الذي تسمح حدوده بتبادل الطاقة فقط ولا تسمح بتبادل مادة النظام مع المحيط ، مثال اناء معدني مغلق يحتوي على ماء مغلي .

3 - النظام المعزول :



وهو النظام الذي لا تسمح حدوده بتبادل المادة و الطاقة مع المحيط ، مثال الثرموس .

خواص النظام:



وهي التغيرات الفيزيائية للنظام التي من الممكن قياسها وملاحظتها ، مثال عدد المولات والحالة الفيزيائية للمواد في النظام والحجم والضغط ودرجة الحرارة .

بعض التعاريف والقوانين المهمة:

السعة الحرارية:

وهي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة m مقدارها بالغرام ($m(g)$) من أي مادة درجة سيليزية واحدة وهي من الخواص الشاملة ووحدتها (J/C°)

الحرارة النوعية ζ :

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة غرام واحد ($1g$) من أي مادة درجة سيليزية واحدة وهي من الخواص المركزة ووحدتها هي ($J/g.C^\circ$)

القوانين المهمة

$$\Delta T = T_f - T_i$$

$$q = C \times \Delta T$$

$$C = \zeta \times m$$

$$q = \zeta \times m \times \Delta T$$

مثال 1

ما مقدار الحرارة الناتجة من تسخين قطعة من الحديد كتلته ($870g$) من $5C^\circ$ الى $95C^\circ$ علما ان الحرارة النوعية للحديد $0.45J/g.C^\circ$ ؟

$$\Delta T = T_f - T_i = 95 - 5C^\circ = 90C^\circ \quad (1) \text{ نجد } \Delta T$$

$$q = \zeta \times m \times \Delta T = 0.45J/g.C^\circ \times 870g \times 90C^\circ = 35235 J \quad (2) \text{ نجد } q$$

سؤال 14

من حبيبات ذهب امتصت $276 J$ من الحرارة عند تسخينها , فاذا علمت ان الحرارة الابتدائية كانت $25C^\circ$ احسب درجة الحرارة النهائية التي سخنت اليها , اذا علمت ان الحرارة النوعية للذهب $0.13 J/g.C^\circ$.

$$q = \zeta \times m \times \Delta T \quad (1) \text{ نجد } \Delta T$$

$$276 J = 0.13 J/g.C^\circ \times 4.5g \times \Delta T \Rightarrow \Delta T = 471.8C^\circ$$

$$(2) \text{ نجد } T_f :$$

$$\Delta T = T_f - T_i \Rightarrow 471.8C^\circ = T_f - 25C^\circ \Rightarrow T_f = 496.8 C^\circ$$

تمرين 1

تغيرت درجة حرارة قطعة من المغنيسيوم كتلتها $10g$ من $25C^\circ$ الى $45C^\circ$ مع اكتساب حرارة مقدارها $205J$ احسب الحرارة النوعية لقطعة المغنيسيوم .

$$\Delta T = T_f - T_i = 45 - 25C^\circ = 20C^\circ \quad (1) \text{ نجد } \Delta T$$

$$(2) \text{ نجد } \zeta :$$

$$q = \zeta \times m \times \Delta T \Rightarrow 205J = \zeta \times 10g \times 20C^\circ \Rightarrow \zeta = 1.025J/g.C^\circ$$

دالة الحالة :

هي تلك الخاصية او الكمية التي تعتمد على الحالة الابتدائية للنظام قبل التغير ، والحالة النهائية للنظام بعد التغير بغض النظر عن المسار الذي تم من خلاله التغير ، مثال الانتالبي ، الانتروبي ، طاقة كبس الحرة .

دالة المسار :

وهي الدالة التي تعتمد على المسار والخطوات وتتغير قيمها بتغير ظروف التجربة مثال الحرارة والشغل .

الكيمياء الحرارية :

وهي علم يختص بدراسة الحرارة الممتصة او المنبعثة (المتحررة) نتيجة التغيرات الفيزيائية والتفاعلات الكيميائية اي حساب او دراسة الانتالبي .

الخواص العامة للمواد :

1 - الخواص الشاملة :

وهي تشمل جميع الخواص التي تعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام ، مثال : الانتالبي ، الانتروبي ، طاقة كبس الحرة ، السعة الحرارية .

2 - الخواص المركزة :

وهي الخواص التي لا تعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام ، مثال : الكثافة ، الحرارة النوعية ، درجة الحرارة ، الضغط ، جهد الخلية E_{Cell} .

حرارة التفاعل (التغير في الانتالبي) :

هي دالة حالة ترموداينمكية وخاصية شاملة لانها تعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام وتمثل كمية الحرارة الممتصة او المتحررة المقاسة بثبوت الضغط .

المسعر :

وهو جهاز يستخدم لقياس انتالبي التفاعل الممتصة او المتحررة في التفاعل الكيميائي عند ثبوت الضغط .

سؤال

إذا تم حرق 3g من مركب الهيدرازين N_2H_4 كتلته المولية ($M = 32 \text{ g/mol}$) في مسعر مفتوح يحتوي على 1000g من الماء (الحرارة النوعية للماء $4.2 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$) فان درجة الحرارة ترتفع من 24.6°C الى 28.2°C احسب الحرارة المتحررة نتيجة الاحتراق والانتالبي لاحتراق 1mol من الهيدرازين بوحدة KJ/mol على افتراض ان السعة الحرارية للمسعر مهمة .

$$\Delta T = T_f - T_i = 28.2^\circ\text{C} - 24.6^\circ\text{C} = 3.6^\circ\text{C} \quad (1) \text{ نجد } \Delta T$$

$$q = \varsigma \times m \times \Delta T = 4.2 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C} \times 1000\text{g} \times 3.6^\circ\text{C} = 15120 \text{ J} \quad (2) \text{ نجد } q$$

$$q = -15120 \text{ J} \quad (3) \text{ بما انه مسعر يعني باعث :}$$

$$n = \frac{m(g)}{M\left(\frac{g}{mol}\right)} = \frac{3g}{32\frac{g}{mol}} = 0.094mol$$

(4) نجد عدد المولات الهيدرازين :

(5) نجد الحرارة المتحررة (q) من احتراق $1mol$ من الهيدرازين :

$$q = \frac{q(J)}{n(mol)} = \frac{-15120J}{0.094mol} = -160851 \frac{J}{mol}$$

(او بطريقة النسبة والتناسب)

$$\Delta H = q_p = -160851 \frac{J}{mol}$$

(6) نجد الانثالبي ΔH : (بثوت الضغط)

$$\Delta H(KJ/mol) = \Delta H \frac{J}{mol} \times \frac{1(KJ)}{1000(J)}$$


(7) نجد الانثالبي ΔH بوحدة KJ :

$$\Delta H(KJ/mol) = -160851 \frac{J}{mol} \times \frac{1(KJ)}{1000(J)} = -161 \left(\frac{KJ}{mol}\right)$$


المعادلة الكيميائية الحرارية :

المعادلة الحرارية يجب ان تبين لنا الاتي :

(1) اشارة (ΔH) فاذا كانت اشارتها موجبة (+) فالتفاعل الكيميائي او التغير الفيزيائي **ماص** للحرارة ،



اما اذا كانت اشارتها سالبة (-) فالتفاعل الكيميائي او التغير الفيزيائي **باعث** للحرارة



(2) يجب ذكر الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة والنتيجة للتفاعل الكيميائي والتغير الفيزيائي ، عل . لان كمية الحرارة الممتصة او المتحررة تتغير بتغير الحالة الفيزيائية لمواد التفاعل .

(3) عند عكس تفاعل كيميائي او تغير فيزيائي فأن اشارة ΔH تعكس ايضاً دون ان تتغير قيمتها .

(4) عند ضرب او قسمة طرفي المعادلة طرفي المعادلة برقم معين فيجب ان تجري نفس العملية على ΔH .

انواع الانثاليات

— انثاليي التكوين القياسية ΔH_f° :

وهي الحرارة اللازمة (ممتصة او منبعثة) لتكوين مول واحد من اي مركب من عناصره الاساسية المتواجدة وبأثبت صورها في الظروف القياسية $25^\circ C$ و ضغط $1 atm$.


شروطها : يتكون مول واحد من المادة ، من عناصره الاساسية ، وبأثبت صورة .

وعند تحقق هذه الشروط الثلاثة فأن : $\Delta H_f^\circ = \Delta H_r^\circ$

امثلة العناصر الاثبت صورة :

P_4 الفسفور صلب	C_{graphite} - كاربون كرافيت S_{rhombic} - كبريت معيني	Fe - صلب Al - صلب	Hg - سائل Mg - صلب	O_2 - غاز
----------------------	---	--------------------------	---------------------------	-------------

مثال لمعادلات التكوين لـ حامض الفسفوريك :



نلاحظ دائماً ظهور كسور في المعادلة الحرارية ، علل ذلك ؟

بسبب كتابة المعادلة الكيميائية التي تمثل تكوين مول واحد من المركب المراد تكوينه .

ما هي العلاقة بين ΔH_f° و ΔH_r° ؟ $\Delta H_f^\circ = \frac{\Delta H_r^\circ}{n_{\text{المتكونة}}}$ (حيث n عدد المولات المتكونة من المعادلة)

إذا علمت ان انثالي التكوين القياسية للبنزين C_6H_6 تساوي $(C_6H_6) = 49 \text{ KJ/mol}$ ، اكتب المعادلة الكيميائية الحرارية للتفاعل بحيث تكون ΔH_f° مساوية الى $\Delta H_f^\circ (C_6H_6)$.



انثالي الاحتراق القياسية : ΔH_c°

وهي الحرارة المتحررة من حرق مول واحد من اي مادة حرقاً تاماً مع الاوكسجين عند الظروف القياسية من درجة حرارة 25°C و ضغط 1 atm .


شروطها : لها ثلاث شروط ، يحترق مول واحد من المادة (عنصر او مركب) - حرق تام مع O_2 - في الظروف القياسية ، وعند تحقق الشروط الثلاثة فإن : $\Delta H_r^\circ = \Delta H_c^\circ$

ملاحظات مهمة

- تشمّل تفاعلات الاحتراق حرق المواد (الوقود) والعناصر مع O_2 .
- لانثالي الاحتراق ΔH_c° اشارة سالبة (-) دائماً لانها باعثة للحرارة .
- حرق المركبات العضوية ينتج دائماً غاز CO_2 والماء السائل H_2O اما حرق العناصر فينتج اكاسيدها .
- عند موازنة تفاعلات الاحتراق للمركبات العضوية نبدأ بالكربون C ثم الهيدروجين H ثم الاوكسجين O

(5) العلاقة التي تربط بين ΔH_r° و ΔH_c° هي : $\Delta H_c^\circ = \frac{\Delta H_r^\circ}{n_{\text{المحترقة}}}$


اكتب المعادلة الكيميائية الحرارية لحرق الكحول الايثيلي السائل $(C_2H_5OH_{(l)})$ اذا علمت ان $\Delta H_c^\circ (C_2H_5OH_{(l)}) = -1367 \text{ KJ/mol}$



احسب التغير في انثالي التكوين القياسية $\Delta H_f^\circ (Al_2O_3)$ والتغير في انثالي الاحتراق القياسية $\Delta H_c^\circ (Al)$ في التفاعل الآتي : $4Al_{(s)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2Al_2O_{3(s)} \quad \Delta H_r^\circ = -3340 \text{ KJ/mol}$

(1) نجد $\Delta_f^\circ (Al_2O_3)$ يحل السؤال بطرق ثلاث :

● نقسم المعادلة اعلاه على العدد 2 :



$$\Delta H_f^\circ = \frac{\Delta H_r^\circ}{n_{\text{المتكونة}}} = \frac{-3340 \text{ kJ}}{2 \text{ mol}} = -1670 \text{ KJ/mol}$$

• او نستخدم العلاقة الآتية :

$$\sum \Delta H_r^\circ = \sum n \Delta H_f^\circ (\text{products}) - \sum n \Delta H_f^\circ (\text{reactants})$$

• او من قانون المجموع

$$\Delta H_r^\circ = [2\Delta H_f^\circ(\text{Al}_2\text{O}_{3(s)})] - [4\Delta H_f^\circ(\text{Al}_{(s)}) + 3\Delta H_f^\circ(\text{O}_{2(g)})]$$

$$-3340 = [2\Delta H_f^\circ(\text{Al}_2\text{O}_{3(s)})] - [4(0) + 3(0)]$$

$$\Delta H_f^\circ = -1670 \text{ KJ/mol}$$

(2) نجد $\Delta H_c^\circ \text{ ل } (\text{Al})$: يحل بطريقتين :

• نقسم المعادلة الأصلية على العدد 4 لكي يحترق مول واحد من الألمنيوم :



$$\Delta H_c^\circ = \frac{\Delta H_r^\circ}{n_{\text{المحترقة}}} = \frac{-3340 \text{ kJ}}{4 \text{ mol}} = -835 \text{ KJ/mol}$$

• او نستخدم العلاقة الآتية :

انثاليي التغيرات الفيزيائية

$$\Delta H_{\text{vap}} = -\Delta H_{\text{cond}} \quad \text{و} \quad \Delta H_{\text{fus}} = -\Delta H_{\text{cryst}}$$

مثال 6



إذا علمت ان انثاليي التبخر للامونيا تساوي 23 KJ/mol . احسب انثاليي التكثيف للامونيا .



نكتب معادلة التبخر للامونيا :



لتكثيف عكس التبخر :

طرائق حساب انثاليي التفاعل القياسية ΔH_r°

(1) طريقة استخدام قانون هيس :



عند تحويل المتفاعلات الى نواتج فإن التغير في انثاليي التفاعل هو نفسه سواء تم التفاعل في خطوة واحدة او سلسلة من الخطوات .

اهميته : حساب ΔH_r° لبعض التفاعلات التي لا يمكن قياس الانثاليي لها بصورة مباشرة .

سؤال




هناك حقيقة يعتمد عليها قانون هيس ، ما هي ؟

هي ان ΔH_r° هي دالة حالة اي انها تعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية للنظام فقط ولا تعتمد على المسارات التي يسلكها التفاعل للتحويل من المواد المتفاعلة الى المواد الناتجة .

احسب انثاليي التكوين القياسية للمركب $\text{CS}_{2(l)}$ من عناصره الاساسية باثبات صورها .

مثال 7



إذا أعطيت المعادلات الحرارية الآتية : $\Delta H_r^\circ = -394 \text{ KJ/mol}$ $C_{\text{graphite}} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$ 1)

$\Delta H_r^\circ = -296 \text{ KJ/mol}$ $S_{\text{rhombic}} + O_{2(g)} \longrightarrow SO_{2(g)}$ 2)

$\Delta H_r^\circ = -1072 \text{ KJ/mol}$ $CS_{2(l)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2SO_{2(g)}$ 3)

المعادلة (1) تبقى كما هي ، المعادلة (2) تضرب بالعدد 2 ، المعادلة (3) تعكس وكالاتي :

1) $C_{\text{graphite}} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$ $\Delta H_r^\circ = -394 \text{ KJ/mol}$

2) $2S_{\text{rhombic}} + 2O_{2(g)} \longrightarrow 2SO_{2(g)}$ $\Delta H_r^\circ = -592 \text{ KJ/mol}$

3) $CO_{2(g)} + 2SO_{2(g)} \longrightarrow CS_{2(l)} + 3O_{2(g)}$ $\Delta H_r^\circ = +1072 \text{ KJ/mol}$



بالجمع

وحيث ان ΔH_f° هي نفسها ΔH_r° اي :

$$\Delta H_f^\circ CS_{2(l)} = -394 \text{ KJ} + (-592 \text{ KJ}) + 1072 \text{ KJ} = 86 \text{ KJ/mol}$$

إذا علمت ان انثالي احتراق كل من غاز CO ، H_2 ، CH_3OH بوحدة KJ/mol هي على التوالي : $(-284, -286, -727)$ احسب ΔH_r° باستخدام قانون هيس للتفاعل الآتي :



كتابة معادلات الاحتراق للغازات الثلاثة (وبشرط احتراق مول واحد من المادة مع الاوكسجين وكالاتي :

1) $CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$ $\Delta H_r^\circ = -284 \text{ KJ/mol}$ تبقى كما هي

2) $H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(l)}$ $\Delta H_r^\circ = -286 \text{ KJ/mol}$ تضرب بـ 2

3) $CH_3OH_{(g)} + \frac{3}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$ $\Delta H_r^\circ = -727 \text{ KJ/mol}$ تعكس

وبعد اجراء التغيرات اعلاه ، تصبح المعادلات كالاتي :

1) $CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$ $\Delta H_r^\circ = -284 \text{ KJ/mol}$

2) $2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(l)}$ $\Delta H_r^\circ = -572 \text{ KJ/mol}$


3) $CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)} \longrightarrow CH_3OH_{(g)} + \frac{3}{2}O_{2(g)}$ $\Delta H_r^\circ = +727 \text{ KJ/mol}$

بالجمع : $CO + 2H_2 \longrightarrow CH_3OH$ $\Delta H_r^\circ = -284 + (-572) + 727 = -129 \text{ KJ}$

جد ΔH_f° لـ Fe_2O_3 من انثالي التفاعلات الآتية :

1) $2Al_2O_3 \longrightarrow 4Al + 3O_{2(g)}$ $\Delta H_r^\circ = 3340 \text{ KJ/mol}$


2) $2Al + Fe_2O_3 \longrightarrow 2Fe + Al_2O_3$ $\Delta H_r^\circ = -853 \text{ KJ/mol}$



1) $2Al_2O_3 \longrightarrow 4Al + 3O_{2(g)}$ $\Delta H_r^\circ = 3340 \text{ KJ/mol}$


2) $2Al + Fe_2O_3 \longrightarrow 2Fe + Al_2O_3$ $\Delta H_r^\circ = -853 \text{ KJ/mol}$

عكس المعادلة الاولى والقسمة على 2 وعكس المعادلة الثانية :





اجب

احسب انثالي التكوين القياسية للاستيلين $C_2H_{2(g)}$ من عناصره الاساسية .



اذا اعطيت المعادلات الحرارية الاتية :




(2) طريقة استخدام قيم انثالي التكوين القياسية ΔH_f° :


ويمكن حساب ΔH_r° من العلاقة الاتية : $\Delta H_r^\circ = \sum n\Delta H_f^\circ (\text{products}) - \sum n\Delta H_f^\circ (\text{reactants})$

تمرين 9

يحترق البنزين (C_6H_6) في الهواء ليعطي ثنائي اوكسيد الكربون والغاز والماء السائل احسب ΔH_r° لهذا التفاعل اذا علمت ان :



نكتب معادلة احتراق البنزين مع غاز الاوكسجين :



$$\Delta H_r^\circ = \sum n\Delta H_f^\circ (\text{products}) - \sum n\Delta H_f^\circ (\text{reactants})$$

$$\Delta H_r^\circ = [6\Delta H_f^\circ (CO_{2(g)}) + 3\Delta H_f^\circ (H_2O_{(l)})] - [\Delta H_f^\circ (C_6H_6) + \frac{15}{2}\Delta H_f^\circ (O_{2(g)})]$$

$$\Delta H_r^\circ = [6(-394) + 3(-286)] - [49 + 0]$$

$$\Delta H_r^\circ = [-2364 - 858] - [49]$$

$$\Delta H_r^\circ = -3271 \text{ KJ/mol}$$

في مسعر حراري وضع 2.6 g من الاستيلين C_2H_2 ($M = 26 \text{ g/mol}$) فوجد ان كمية الحرارة المنبعثة من الاحتراق تساوي 130 KJ . احسب انثالي التكوين القياسية للاستيلين اذا علمت ان



$$n = \frac{m(g)}{M(\frac{g}{mol})} = \frac{2.6 \text{ g}}{26 \frac{g}{mol}} = 0.1 \text{ mol}$$


(1) نجد $n(\text{mol})$

$$q = \frac{q \text{ (kJ)}}{n \text{ (mol)}} = \frac{130 \text{ kJ}}{0.1 \text{ mol}} = 1300 \text{ KJ/mol} \quad \text{C}_2\text{H}_2 \text{ نجد المتحررة من احتراق مول واحد من}$$

$$q = -1300 \text{ KJ/mol} \quad \text{(3) بما التفاعل في مسعر فأن } q \text{ تكون سالبة :}$$

$$\Delta H = q_p = -1300 \text{ KJ/mol} \quad \text{(4) بما التفاعل في مسعر مفتوح فأن}$$

(5) نكتب معادلة احتراق الاستيلين (على ان تحقق شروط الاحتراق اي حرق مول واحد مع O_2 حرقاً تاماً) :



(6) نجد ΔH_f° للاستيلين من ΔH_r° :

$$\Delta H_r^\circ = \sum n \Delta H_f^\circ (\text{products}) - \sum n \Delta H_f^\circ (\text{reactants})$$

$$\Delta H_r^\circ = [2\Delta H_f^\circ(\text{CO}_{2(g)}) + \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_{(l)})] - [\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) + \frac{5}{2} \Delta H_f^\circ(\text{O}_{2(g)})]$$

$$-1300 = [2(-393.5) + (-286)] - [\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) + 3(0)]$$

$$-1300 = [-787 - 286 - \Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_2)]$$

$$\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) = +227 \text{ KJ/mol}$$

العمليات التلقائية

العمليات التلقائية :

هي اي عملية فيزيائية او كيميائية يمكن ان تحدث من تلقاء نفسها عند ظروف معينة دون تأثير من اي عامل خارجي ، مثال :

(1) تمدد الغاز تلقائياً في الاناء المفرغ من الهواء ، ولكن تجمع جزيئات الغاز في وعاء واحد غير تلقائي .

(2) سقوط الماء من اعلى الشلال تلقائي ، لكن صعوده غير تلقائي .

ما هو السبب الذي يجعل بعض العمليات تحدث تلقائياً ؟

سؤال

وذلك لان جميع العمليات التلقائية يرافقها انخفاض في طاقة النظام الكلية اي الطاقة النهائية اقل من الطاقة الابتدائية للنظام ، وهذا مثلاً هو السبب في انتقال الحرارة من الجسم الساخن الى الجسم البارد و سقوط الماء من اعلى الشلال .

الانثروبي :

وهي دالة حالة ثرموداينمكية تعتبر مقياس درجة اللانظام للنظام (العشوائية) ، ويرمز لها بالرمز S .

العمليات التي تزداد فيها الانثروبي (ΔS موجبة +) :

تزداد الانثروبي في عملية الانصهار ، علل ذلك ؟

سؤال

وذلك لان الذرات او الجزيئات في الحالة الصلبة تكون محصورة في مواقع ثابتة ، وعند الانصهار تبدأ هذه الذرات او الجزيئات بالحركة خارج الشبكة البلورية مما يزيد العشوائية .

تزداد الانثروبي في عملية التبخر ، علل ذلك ؟

سؤال

بسبب ان الذرات والجزيئات في الطور الغازي تنتشر بشكل عشوائي اكثر لملء فراغات جميع الحيز الذي تتواجد فيه . (ولنفس السبب تزداد في عملية التسامي) .

سؤال (3) الذوبان  **تزداد الانتروبي في عملية الذوبان للمواد الصلبة ، علل ؟**

وذلك بسبب تكسر النظام الهيكلي المنتظم للمذاب والمذيب اي بسبب :

(1) عملية تكوين المحلول (**خلط المذاب مع المذيب**) (2) تفكك المركب الصلب الى ايونات .

سؤال (4) التسخين  **تزداد انتروبي النظام بالتسخين ، علل ؟**

وذلك لان عملية التسخين تؤدي الى :

(1) زيادة الحركات الانتقالية والدورانية والاهتزازية للجزيئات

(2) زيادة انواع الطاقات المرتبطة جميعها بالحركة الجزيئية

ملاحظات

- (1) تزداد الانتروبي (ΔS +) في : الانصهار - التبخر - الذوبان - التسخين - التسامي - التفكك .
- (2) تقل الانتروبي (ΔS -) في : الانجماد - التكثيف - الترسيب - التبريد .

سؤال

- تنبأ فيما اذا كان التغير في الانتروبي ΔS اكبر او اقل من الصفر للعمليات الآتية :
- أ () تجمد كحول الاثيل
- ب () تبخر سائل البروم
- ج () ذوبان الكلوكون في الماء
- د () تسخين غاز H_2 من $20^\circ C$ الى $80^\circ C$.

- أ () بما ان عملية الانجماد تحول الكحول السائل الى الصلب الذي تكون فيه الجزيئات اكثر انتظاماً $\Delta S < 0$.
- ب () تحول البروم السائل الى البخار يزيد من عشوائية الجزيئات وبالتالي فالتغير في الانتروبي $\Delta S > 0$.
- ج () انتشار جزيئات الكلوكون الصلب في الماء يؤدي الى زيادة العشوائية اي التغير في الانتروبي $\Delta S > 0$.
- د () يزيد التسخين من عشوائية النظام اي يزيد من الانتروبي (موجبة +) او ($\Delta S > 0$) .

حساب الانتروبي القياسية للفاعلات الكيميائية ΔS_r° :

تحسب من العلاقة : $\Delta S_r^\circ = \sum nS^\circ (products) - \sum nS^\circ (reactants)$

مثال 10

احسب ΔS_r° للتفاعل التالي $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)}$ اذا علمت ان :

$S^\circ(CO) = 198 J/K.mol$, $S^\circ(O_2) = 205 J/K.mol$, $S^\circ(CO_2) = 214 J/K.mol$

$$\Delta S_r^\circ = \sum nS^\circ (products) - \sum nS^\circ (reactants)$$

$$\Delta S_r^\circ = [2S^\circ(CO_2)] - [2S^\circ(CO) + S^\circ(O_2)]$$

$$\Delta S_r^\circ = [2 \times 214] J/K.mol - [2 \times 198 + 205] J/K.mol$$

$$\Delta S_r^\circ = 428 - 396 - 205 = -173 J/K.mol$$

طاقة كبس الحرارة:

طاقة كبس الحرارة:

وهي دالة حالة ثرموداينمكية تتيح لنا التنبؤ بتلقائية العمليات الفيزيائية والكيميائية وتمثل الطاقة العظمى التي يمكن الحصول عليها من قياس التغير في الانثالبي والانتروبي ويرمز لها بالرمز G ، ولها ثلاث حالات :

- (1) ΔG لها قيمة سالبة ($\Delta G < 0$) ، يعني ان التفاعل الكيميائي او التغير الفيزيائي يجري تلقائياً .
- (2) ΔG لها قيمة موجبة ($\Delta G > 0$) ، يعني ان التفاعل الكيميائي او التغير الفيزيائي يجري غير تلقائي .
- (3) ΔG تساوي صفر ($\Delta G = 0$) ، يعني ان التفاعل الكيميائي او التغير الفيزيائي في حالة اتزان .

طاقة كبس الحرارة القياسية للتفاعل ΔG_r°

هي التغير في الطاقة الحرة للتفاعل عندما يجري في الظروف القياسية (25°C و ضغط 1atm) .

سؤال لكي تكون العملية تلقائية يجب توفر عاملين مهمين هما ان تكون ΔS و ΔH بغض النظر عن تأثير

موجبة اكبر من الصفر ، سالبة اقل من الصفر ، درجة الحرارة .

طاقة كبس الحرارة للتكوين القياسية ΔG_f° :طاقة كبس الحرارة القياسية للتفاعل ΔG_r°

هي مقدار التغير في الطاقة الحرة عند تكوين مول واحد من اي مركب من عناصره الاساسية بأثبت صورها عند الظروف القياسية في 25°C و ضغط 1atm .

تمرين 12 جد قيمة ΔG_r° للتفاعل التالي عند الظروف القياسي 25°C و ضغط 1atm .

وبين هل التفاعل يحدث تلقائياً ام لا يحدث ؟ $2\text{NO}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{NO}_{2(g)}$
 اذا علمت ان : $\Delta G_f^\circ(\text{NO}_{2(g)}) = 52 \text{ KJ/mol}$ و $\Delta G_f^\circ(\text{NO}_{(g)}) = 87 \text{ KJ/mol}$

$$\Delta G_r^\circ = \sum n\Delta G_f^\circ(\text{products}) - \sum n\Delta G_f^\circ(\text{reactants})$$

$$\Delta G_r^\circ = [2\Delta G_f^\circ(\text{NO}_{2(g)})] - [2\Delta G_f^\circ(\text{NO}_{(g)}) + \Delta G_f^\circ(\text{O}_{2(g)})]$$

$$\Delta G_r^\circ = [2(52)] - [2 \times 87 + (0)] = 104 - 174 = -70 \text{ KJ/mol}$$

تمرين 12 للتفاعل الاتي : $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(l)} + 3\text{O}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{CO}_{2(g)} + 3\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ بالاستعانة بالمعلومات الاتية :

المادة	$\Delta H_f^\circ \text{ KJ/mol}$	$S^\circ \text{ J/K.mol}$
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	-278	161
O_2	0	205
CO_2	-394	214
H_2O	-286	70

احسب :

أ ΔH_r°

ب ΔS_r°

ج ΔG_r°

عند الظروف القياسية

أ ΔH_r° حساب : $\Delta H_r^\circ = \sum n\Delta H_f^\circ(\text{products}) - \sum n\Delta H_f^\circ(\text{reactants})$

$$\Delta H_r^\circ = [2\Delta H_f^\circ(\text{CO}_{2(g)}) + 3\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_{(l)})] - [\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) + 3\Delta H_f^\circ(\text{O}_{2(g)})]$$

$$\Delta H_r^0 = [2(-394) + 3(-286)] - [-278 + 3(0)]$$

$$\Delta H_r^0 = [-788 - 858 + 278]$$

$$\Delta H_r^0 = -1368 \text{ KJ/mol}$$

$$\Delta S_r^0 = \sum nS^0 (\text{products}) - \sum nS^0 (\text{reactants})$$

ب (حساب ΔS_r^0 :

$$\Delta S_r^0 = [2S^0(\text{CO}_2) + 3S^0(\text{H}_2\text{O}_{(l)})] - [S^0(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) + 3S^0(\text{O}_2)]$$

$$\Delta S_r^0 = [2 \times 214 + 3 \times 70] - [161 + 3 \times 205]$$

$$\Delta S_r^0 = 428 + 210 - 161 - 615$$

$$\Delta S_r^0 = -138 \text{ J/K.mol}$$

$$\Delta S_r^0 = -0.138 \text{ KJ/K.mol}$$

$$T(K) = t(C^0) + 273$$

ج (حساب ΔG_r^0 :

$$T(K) = 25(C^0) + 273 = 298K$$

$$\Delta G_r^0 = \Delta H_r^0 - T\Delta S_r^0$$

$$\Delta G_r^0 = -1368 \text{ KJ/mol} - 298K (-0.138 \text{ KJ/K.mol})$$

$$\Delta G_r^0 = -1368 \text{ KJ/mol} + 41 \text{ KJ/mol}$$

$$\Delta G_r^0 = -1327 \text{ KJ/mol}$$

والتفاعل تلقائي لان ΔG سالبة .

تتفكك كاربونات الكالسيوم حسب المعادلة الاتية :



ΔH_f^0 لكل من CaCO_3 , CaO , CO_2 هي على التوالي بوحدة KJ/mol

(-393.5 , -635 , -1207) جد (1) ΔH_r^0 للتفاعل ثم ارسم مخطط

للطاقة (2) ΔG_r^0 للتفاعل (3) درجة الحرارة التي سيصبح عندها التفاعل تلقائي .


$$\Delta H_r^0 = \sum n\Delta H_f^0 (\text{products}) - \sum n\Delta H_f^0 (\text{reactants})$$

1 (نجد ΔH_r^0 :

$$\Delta H_r^0 = [\Delta H_f^0(\text{CaO}) + \Delta H_f^0(\text{CO}_2)] - [\Delta H_f^0(\text{CaCO}_3)]$$

$$\Delta H_r^0 = [-635 + (-393.5)] - [-1207]$$

$$\Delta H_r^0 = -635 - 393.5 + 1207 = +178.5 \text{ KJ/mol}$$



التفاعل اعلاه تفاعل تفكك وجميع تفاعلات الفك ماصة

وبما ان التفاعل ماص للحرارة فهذا يعني ان طاقة النواتج اكبر من طاقة المتفاعلات وحسب المخطط الآتي :

(2) نجد ΔG_r° : نحول وحدة ΔS الى $KJ/K.mol$: $\Delta S_r^\circ KJ/K.mol = \Delta S_r^\circ J/K.mol \times \frac{1 kJ}{1000 J}$

$$\Delta S_r^\circ KJ/K.mol = 160 J/K.mol \times \frac{1 kJ}{1000 J} = 0.16 KJ/K.mol$$

نجد $T(K)$: $T(K) = t(C^\circ) + 273 = 25(C^\circ) + 273 = 298K$

نطبق علاقة كبس : $\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T\Delta S_r^\circ$

$$\Delta G_r^\circ = +178.5 KJ/mol - 298K (0.16 KJ/K.mol)$$

$$\Delta G_r^\circ = +178.5 KJ/mol - 47.68 KJ/mol$$

$$\Delta G_r^\circ = +130.8 KJ/mol \quad (\text{التفاعل غير تلقائي})$$

(3) ولكي يكون التفاعل تلقائي (ΔG سالبة) يجب ان يكون : $T\Delta S > \Delta H$

$$T > \frac{\Delta H}{\Delta S} \Rightarrow T > \frac{+178.5 KJ/mol}{0.16 KJ/K.mol} \Rightarrow T > 1115.6K$$

سؤال للتفاعل $2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(g)}$ احسب قيمة ΔS_r° للتفاعل بوحدة $J/K.mol$ علماً بأن : $\Delta G_f^\circ(H_2O) = -228 KJ/mol$ و $\Delta H_f^\circ(H_2O) = -242 KJ/mol$

نجد ΔS_r° من علاقة كبس بعد ايجاد ΔH_r° و ΔG_r° من قانون المجموع Σ لكل منهما :

(1) نجد ΔH_r° : $\Delta H_r^\circ = \sum n\Delta H_f^\circ (products) - \sum n\Delta H_f^\circ (reactants)$

$$\Delta H_r^\circ = [2\Delta H_f^\circ(H_2O)] - [2\Delta H_f^\circ(H_2) + \Delta H_f^\circ(O_2)] \quad (\Delta H_f^\circ = \frac{\Delta H_r^\circ}{n_{\text{المتكونة}}})$$

$$\Delta H_r^\circ = [2(-242)] - [2(0) + 0] = -484 KJ/mol$$

(2) نجد ΔG_r° : $\Delta G_r^\circ = \sum n\Delta G_f^\circ (products) - \sum n\Delta G_f^\circ (reactants)$

$$\Delta G_r^\circ = [2\Delta G_f^\circ(H_2O)] - [2\Delta G_f^\circ(H_2) + \Delta G_f^\circ(O_2)]$$

$$\Delta G_r^\circ = [2\Delta G_f^\circ(H_2O)] - [2\Delta G_f^\circ(H_2) + \Delta G_f^\circ(O_2)]$$

$$\Delta G_r^\circ = [2(-228)] - [2(0) + (0)] = -456 \frac{KJ}{mol}$$

$$(\Delta G_f^\circ = \frac{\Delta G_r^\circ}{n_{\text{المتكونة}}})$$

$$T(K) = t(C^\circ) + 273 = 25(C^\circ) + 273 = 298K$$

(3) نجد ΔS_r° : (من علاقة كبس)

$$\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T\Delta S_r^\circ$$

$$-456 = -484 - 298 \Delta S_r^\circ$$

$$298 \Delta S_r^\circ = -28$$

$$\Delta S_r^\circ = -0.094 KJ/K.mol$$

$$\Delta S_r^\circ J/K.mol = -0.094 KJ/K.mol \times \frac{1000 J}{1KJ} = -94 J/K.mol$$

ΔH_f° و ΔG_f° تساوي صفر
لغازي H_2 و O_2 لانهما بآثبت صورة

جد قيمة ΔG_r° للتفاعل $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)}$ الذي يجري بالظروف القياسية
إذا أعطيت المعلومات الآتية : $\Delta H_f^\circ(CO_{2(g)}) = -393.5 \text{ KJ/mol}$ ،
 $S^\circ(CO_2) = 214 \text{ J/K.mol}$ ، $\Delta H_f^\circ(CO_{(g)}) = -110.5 \text{ KJ/mol}$
 $S^\circ(O_2) = 205 \text{ J/K.mol}$ ، $S^\circ(CO) = 198 \text{ J/K.mol}$ ،

واجب

سؤال 37

جد درجة الحرارة التي ستصبح عندها التفاعلات التالية تلقائية إذا علمت أن قيم ΔS لها

التفاعل A : $\Delta H = +126 \text{ KJ/mol}$ و $\Delta S = +48 \text{ J/K.mol}$

التفاعل B : $\Delta H = -12 \text{ KJ/mol}$ و $\Delta S = -105 \text{ J/K.mol}$

التفاعل A : تحويل وحدة ΔS الى KJ/K.mol :

$$\Delta S \text{ KJ/K.mol} = +48 \text{ J/K.mol} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}} = +0.048 \text{ KJ/K.mol}$$

وباستخدام علاقة كبس

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ولكي يكون التفاعل تلقائي $(-\Delta G)$ ،

يجب أن يكون $T\Delta S > \Delta H$ + - (+)

+ -

أي بالتسخين يكون تلقائي $\Rightarrow T > \frac{126 \text{ kJ/mol}}{0.048 \text{ KJ/K.mol}} \Rightarrow T > 2625$

التفاعل B : يحل بنفس خطوات التفاعل A .

سؤال 34 (1) عند أي درجة حرارة ينصهر الجليد تلقائياً



$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

ΔH موجبة (+) ماص لأن العملية انصهار

- = + - (+)

ΔS موجبة (+) زيادة في الاضطرابي لأنه انصهار


- = + -

ΔG سالبة (-) لأنه تلقائي من السؤال

ينصهر الجليد تلقائياً عندما يكون $T\Delta S > \Delta H$ أي في درجات الحرارة العالية .

سؤال 34 (2) لا يتحلل الماء الى عناصره الأولية بالظروف الاعتيادية

(جميع تفاعلات التفكك (التحلل) ماصة ΔH +)



$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

ΔH موجبة (+) ماص لأنه تفكك

+ = + - (+)


ΔS موجبة (+) زيادة في الاضطرابي بسبب تحول السائل الى غاز

+ = + -

ΔG موجبة (+) لأنه غير تلقائي من السؤال

التفاعل غير تلقائي بسبب $\Delta H > T\Delta S$

سؤال 34 (3) يذوب غاز ثنائي اوكسيد الكبريت في الماء تلقائياً ويبعث حرارة أثناء عملية ذوبانه



$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

ΔH سالبة (-) لأنه باعث من السؤال

- = - - (-)

ΔS سالبة (-) لأنه ذوبان غاز في سائل (نقصان في الاضطرابي)

- = - +

ΔG سالبة (-) لأنه تلقائي من السؤال

التفاعل تلقائي بسبب $\Delta H > T\Delta S$

سؤال 34 (4) تتفكك كاربونات الكالسيوم تلقائياً عند درجات الحرارة العالية .



$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$- = + \quad - (+)$$

$$- = + \quad -$$

التفاعل تلقائي بسبب $T\Delta S > \Delta H$

ΔH موجبة (+) ماص لأنه تفكك

ΔS موجبة (+) بسبب تحرر غاز من صلب

ΔG موجبة (+) لأنه غير تلقائي من السؤال

سؤال 34 (5) لا يجمد الماء تلقائياً بالظروف الاعتيادية



$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$+ = - \quad - (-)$$

$$+ = - \quad +$$

العملية غير تلقائية بسبب $T\Delta S > \Delta H$

ΔH سالبة (-) باعث لأنه انجماد

ΔS سالبة (-) نقصان في الانتروبي لأنه العملية انجماد

ΔG موجبة (+) لأنه غير تلقائي من السؤال

حساب انتروبي التغيرات الفيزيائية:

نحسب من العلاقات الآتية:

$$\Delta S_{vap} = \frac{\Delta H_{vap}}{T_b} \quad \Delta S_{fus} = \frac{\Delta H_{fus}}{T_m}$$

احسب التغير في الانتروبي للتحويل الآتي $\Delta H_{vap} = 44 \text{ KJ/mol}$

$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_2O_{(s)}$ عند درجة غليان الماء 100°C .

سؤال

$$T(K) = t(^{\circ}\text{C}) + 273 = 100^{\circ}\text{C} + 273 = 373K \quad (1)$$

$$\Delta S_{vap} = \frac{\Delta H_{vap}}{T_b} = \frac{44 \text{ kJ/mol}}{373 \text{ K}} = 0.118 \frac{\text{kJ}}{\text{K.mol}} = 118 \frac{\text{J}}{\text{K.mol}} \quad (2)$$

انواع التفاعلات:

1 - التفاعلات غير الانعكاسية:

التفاعلات الكيميائية التي يتم فيها عند ظروف معينة استهلاك تام لاحد او جميع المواد المتفاعلة ولا يكون للمواد الناتجة عند ظروف التفاعل نفسها القدرة على ان تتفاعل لتكوين المواد التي تكونت منها ، مثال تفاعلات الاحتراق .

2 - التفاعلات الانعكاسية:

هي التفاعلات الكيميائية التي يتم فيها تحول المواد المتفاعلة الى نواتج في بداية التفاعل ويكون للمواد الناتجة المقدرة على ان تتفاعل مع بعضها لتكوين المواد التي تكونت منها مرة اخرى ، مثال $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$

حالة الاتزان الكيميائي:

حالة اتزان ديناميكي (حركي) وليس حالة اتزان استاتيكي (ساكن) تصل اليها اغلب التفاعلات الانعكاسية عندما تصبح معدل سرعة التفاعل بكلا الاتجاهين متساوية ، فتكون تراكيز المواد الناتجة والمتفاعلة عندها ثابتة دون تغير مالم يحدث اي تغيير على الظروف التي يتم عندها التفاعل ، لذا يبدو التفاعل في تلك الحالة قد توقف .

انواع التفاعلات الانعكاسية:

1 - التفاعلات الانعكاسية المتجانسة:

التفاعلات التي تكون فيها المواد المتفاعلة والناتجة جميعها في طور واحد .

2 - التفاعلات الانعكاسية الغير المتجانسة:

التفاعلات التي تكون فيها المواد المتفاعلة والناتجة في اكثر من طور واحد .

قانون فعل الكتلة:

عند ثبوت درجة الحرارة فان سرعة التفاعل الكيميائي تتناسب طردياً مع التراكيز المولارية للمواد المتفاعلة كلا منها مرفوع الى اس يمثل عدد المولات في المعادلة الكيميائية الموزونة .

أمثلة 1

تفاعل ما متزن ثابت الاتزان له K_{eq} يساوي 4.24 وثابت سرعة التفاعل الخلفي k_b يساوي 0.02 ، احسب ثابت سرعة التفاعل الامامي k_f .

$$K_{eq} = \frac{k_f}{k_b} \Rightarrow 4.24 = \frac{k_f}{0.02} \Rightarrow k_f = 4.24 \times 0.02 = 0.0848$$

انواع K_{eq}

- (1) K_c - ثابت الاتزان بدلالة التراكيز المولارية
 - (2) K_p - ثابت الاتزان بدلالة الضغوط الجزئية
- حساب ثابت الاتزان K_{eq}
- (1) ايجاد ثابت الاتزان بصورة مباشرة :

جد قيمة K_{eq} للتفاعل الآتي عند $100C^0$ $2NO_{2(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4(g)}$ اذا علمت ان التراكيز لمواد التفاعل عند حصول حالة الانزان هي كالآتي : $[N_2O_4] = 0.002 M$ و $[NO_2] = M$ و 0.017

$$K_c = \frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2} = \frac{(0.002)}{(0.017)^2} = 6.92 \quad \text{الحل بصورة مباشرة :}$$

سؤال

(2) طريقة استخدام الجدول :

في احد التجارب العلمية ادخل $0.625 mol$ من غاز N_2O_4 في وعاء سعته فتفكك الغاز حسب التفاعل التالي وبدرجة حرارة معينة . وعند وصول التفاعل الى حالة الانزان وجد ان تركيز N_2O_4 المتبقي يساوي $0.025 mol/L$ ، احسب قيمة K_c لهذا التفاعل



(1) نحسب المولارية للتراكيز الابتدائية : $M = \frac{n(mol)}{v(L)} = \frac{0.625 mol}{5L} = 0.125 mol/L$

(2) كتابة الجدول :

M	$N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$	
التراكيز الابتدائية	0.125	0.0
التغير في التراكيز	$-x$	$+2x$
التراكيز عند الانزان	$0.125 - x$	$2x$

(3) نجد قيمة x من تركيز N_2O_4 المتبقي :

بما ان $[N_2O_4]$ عند الانزان يساوي تركيزه المتبقي لذا فان قيمة x تحسب كالآتي :

$$0.125 - x = 0.025 \Rightarrow x = 0.125 - 0.025 = 0.1 mol/L$$

اما $[NO_2]$ عند الانزان فهو : $[NO_2] = 2x = 2(0.1) = 0.2 mol/L$

(3) حساب K_c : $K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{(0.2)^2}{0.025} = \frac{0.040}{0.025} = 1.6$

في التفاعل الغازي الآتي : $3H_{2(g)} + N_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ وضعت كميات مختلفة (مولات مختلفة) من H_2 و N_2 في اناء سعة لتر وعند وصول التفاعل لحالة الانزان وجد ان ما استهلك من H_2 يساوي $0.3 mol$ وما تبقى من N_2 يساوي $0.2 mol$. ما عدد مولات كل من H_2 و N_2 قبل التفاعل علما ان ثابت بان ثابت الانزان K_c للتفاعل يساوي 200 .

(1) التركيز المولاري : بما ان الحجم $1L$ فالتركيز المولاري يساوي عدد المولات

(2) الفرضية : نفرض ان عدد مولات H_2 الابتدائية تساوي y

نفرض ان عدد مولات N_2 الابتدائية تساوي z

(3) كتابة الجدول :

M	$3H_{2(g)} + N_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$		
التراكيز الابتدائية	y	z	0.0
التغير في التراكيز	$-3x$	$-x$	$+2x$
التراكيز عند الانزان	$y - 3x$	$z - x$	$2x$

(4) نجد قيمة x من تركيز H_2 المستهلك : $3x = 0.3 mol \Rightarrow x = 0.1 mol$

نجد قيمة z من تركيز N_2 المتبقي : $z - x = 0.2 mol \Rightarrow z - 0.1 = 0.2 mol \Rightarrow z = 0.3 mol$

نجد قيمة y من K_c والتراكيز عند الامتزان :

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[H_2]^3[N_2]} \Rightarrow 200 = \frac{[0.2]^2}{(y-0.3)^3(0.2)}$$

$$(y-0.3)^3 = \frac{0.2}{200} \Rightarrow (y-0.3)^3 = \frac{1}{1000}$$

$$y-0.3 = 0.1 \Rightarrow y = 0.4 \text{ mol}$$

سؤال

في التفاعل المتزن الغازي : $PCl_3(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons PCl_5(g)$ وجد انه ضغط PCl_3 الجزئي في الاناء المغلق ضعف ضغط Cl_2 الجزئي وعند وصول التفاعل الى موضع الامتزان بدرجة حرارة معينة وجد ان ضغط Cl_2 يساوي 1 atm فاذا علمت ان K_p للتفاعل يساوي $\frac{1}{6}$ فما ضغطا غازي PCl_3 و Cl_2 في بداية التفاعل .

(1) الفرضية : نفرض ان الضغط الابتدائي $P_{Cl_2} = y$ و $P_{PCl_3} = 2y$ (لانه ضعف)

(2) كتابة الجدول :

الضغط / atm	$PCl_3(g)$	$Cl_2(g)$	$PCl_5(g)$
الضغوط الابتدائية	$2y$	y	0
التغير في الضغوط	$-x$	$-x$	$+x$
الضغوط عند الامتزان	$2y - x$	$y - x$	x

(3) نجد قيمة x : (1) $P_{Cl_2} = y - x$ من الجدول عند الامتزان

(2) $P_{Cl_2} = 1$ من السؤال عند الامتزان

نجد قيمة x بعد مساواة المعادلتين : اي ان : $y - x = 1 \Rightarrow x = y - 1$

(4) نعوض قيمة x في الضغوط عند الامتزان لنحصل على مجهول واحد هو y :

$$P_{PCl_3} = 2y - x = 2y - (y - 1) = y + 1$$

(5) نجد قيمة y من K_p : $K_p = \frac{P_{PCl_5}}{P_{PCl_3} P_{Cl_2}} \Rightarrow \frac{1}{6} = \frac{(y-1)}{(y+1)(1)}$

$$y + 1 = 6y - 6 \Rightarrow 5y = 7 \Rightarrow y = 1.4 \text{ atm}$$

$$P_{Cl_2} = y = 1.4 \text{ atm} \quad P_{PCl_3} = 2y = 2(1.4) = 2.8 \text{ atm}$$

سؤال

للتفاعل المتزن : $CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ وفي اناء حجمه لتر واحد تم خلط مولات متساوية من H_2 و CO_2 وبدرجة حرارة 2000 K وصل التفاعل حالة الامتزان فوجد ان عدد المولات الكلية لخليط الغازات عند الامتزان تساوي 3 mol . ما تراكيز خليط الامتزان علماً بأن ثابت الامتزان K_c يساوي 4 ؟

(1) الفرضية : نفرض ان عدد المولات لكل من CO_2 و H_2 في بدائية التفاعل y

(2) نعمل جدولاً وكالاتي :

M	$CO_2(g)$	$H_2(g)$	$CO(g)$	$H_2O(g)$
التراكيز الابتدائية	y	y	0	0
التغير في التراكيز	$-x$	$-x$	$+x$	$+x$
التراكيز عند الامتزان	$y - x$	$y - x$	x	x

$$n_T = n_{CO_2} + n_{H_2} + n_{CO} + n_{H_2O}$$

$$3mol = y - x + y - x + x + x$$

$$2y = 3 \Rightarrow y = 1.5mol$$

$$K_C = \frac{[CO][H_2O]}{[CO_2][H_2]} \Rightarrow 4 = \frac{x^2}{(1.5-x)^2} \quad \sqrt{\quad}$$

$$2 = \frac{x}{1.5-x} \Rightarrow x = 1 mol/L$$

$$[CO_2] = [H_2] = y - x = 1.5 - 1 = 0.5 mol/L$$

$$[CO] = [H_2O] = x = 1 mol/L$$

(3) نجد قيمة y من عدد المولات الكلية n_T :

(4) نجد قيمة x من K_C :

(5) التراكيز المولارية عند الاتزان :

للتفاعل الغازي الآتي : $2SO_{3(g)} \rightleftharpoons 2SO_{2(g)} + O_{2(g)}$ في وعاء مغلق حجمه لتر واحد وجد ان ضغط غاز SO_3 قبل تفككه يساوي $3atm$ عند درجة حرارة معينة بلغ التفاعل حالة الاتزان فوجد ان الضغط الكلي لخليط الغازات يساوي $4atm$ احسب K_P للتفاعل عند الاتزان .

سؤال

(1) كتابة الجدول :

الضغط/ atm	$2SO_{3(g)}$	$\rightleftharpoons$	$2SO_{2(g)}$	$+$	$O_{2(g)}$
الضغوط الابتدائية	3		0.0		0.0
التغير في الضغوط	$-2x$		$+2x$		$+x$
الضغوط عند الاتزان	$3 - 2x$		$2x$		x

(2) نجد قيمة x من P_T :

(الضغط الكلي) $P_T =$ مجموع الضغوط الجزئية لمزيج الغازات عند الاتزان :

$$P_T = P_{SO_3} + P_{SO_2} + P_{O_2}$$

$$4atm = 3 - 2x + 2x + x$$

$$x = 1 atm$$

$$P_{SO_3} = 3 - 2x = 3 - 2(1) = 1 atm$$

$$P_{SO_2} = 2x = 2(1) = 2 atm$$

$$P_{O_2} = x = 1 atm$$

$$K_P = \frac{p_{SO_2}^2 p_{O_2}}{p_{SO_3}^2} = \frac{(2^2)(1)}{(1)^2} = 4$$

(4) حساب K_P :

(3) نجد الضغوط الجزئية عند الاتزان :

للتفاعل الآتي الماص للحرارة $C_2H_{6(g)} \rightleftharpoons C_2H_{4(g)} + H_{2(g)}$ وضعت مولات من C_2H_6 في اناء حجمه لتر وبدرجة حرارة معينة وصل التفاعل الى حالة الاتزان فوجد ان ربع كمية الغاز قد استهلكت فأذا علمت ان ثابت الاتزان K_C للتفاعل $\frac{1}{2}$ جد تراكيز خليط الاتزان ؟

سؤال

(1) الفرضية : نفرض ان : $n(C_2H_6) = y$ اي المولات الابتدائية او التركيز المولاري $V = 1L$

M	$C_2H_{6(g)}$	$\rightleftharpoons$	$C_2H_{4(g)}$	$+$	$H_{2(g)}$
التراكيز الابتدائية	y		0		0
التغير في التراكيز	$-x$		$+x$		$+x$
التراكيز عند الاتزان	$y - x$		x		x

(2) كتابة الجدول :

(3) نجد قيمة y و x :

من السؤال كمية الغاز المستهلكة (ربع الكمية) هي نفسها تساوي التغير في التركيز (x) :

$$x = \frac{y}{4} \Rightarrow y = 4x$$

(4) نجد قيمة x من K_c :

$$[C_2H_2] = y - x = 4x - x = 3x$$

$$K_c = \frac{[C_2H_4][H_2]}{[C_2H_6]} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{(x)^2}{3x} \Rightarrow x = 1.5 \text{ mol}$$

$$[C_2H_4][H_2] = x = 1.5 \text{ mol/l}$$

(5) نجد التراكيز عند الارتزان :

$$[C_2H_6] = 3x = 3(1.5) = 4.5 \text{ mol/l}$$

في التفاعل الغازي الاتي عند درجة حرارة معينة $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ وضعت مولات مختلفة من NO و O_2 في اناء التفاعل حجمه لتر وعند وصول التفاعل الى حالة الارتزان وجد ان المتكون NO_2 يساوي 0.8 mol وتركيز كل من NO و O_2 متساويان و $K_c = 10$ ، جد عدد مولات O_2 و NO قبل بدء التفاعل ؟

سؤال

(1) الفرضية : نفرض ان عدد مولات NO الابتدائية تساوي $y \text{ mol}$
نفرض ان عدد مولات O_2 الابتدائية تساوي $z \text{ mol}$

(2) كتابة الجدول :

M	$2NO$	$+ O_2$	$\rightleftharpoons 2NO_2$
التراكيز الابتدائية	y	z	0.0
التغير في التراكيز	$-2x$	$-x$	$+2x$
التراكيز عند الارتزان	$y - 2x$	$z - x$	$2x$

(3) نجد قيمة x من تركيز NO_2 المتكون عند الارتزان : $2x = 0.8 \text{ mol} \Rightarrow x = 0.4 \text{ mol}$

(4) نعوض قيمة x في التراكيز عند الارتزان لنحصل على :

$$[NO] = y - 2x = y - 2(0.4) = y - 0.8$$

$$[O_2] = z - x = z - 0.4$$

$$[NO_2] = 2x = 2(0.4) = 0.8$$

(5) بما ان تركيز كل من O_2 و NO متساويان عند الارتزان نفرض تركيز كل منهما يساوي a

$$a = y - 0.8 = z - 0.4 \quad (\text{او ايجاد تركيز احدهما من الاخر})$$

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[NO]^2 [O_2]} \Rightarrow 10 = \frac{[0.8]^2}{[a]^2 [a]} \quad (6) \text{ نجد قيمة } a \text{ من } K_c :$$

$$10 = \frac{0.64}{[a]^3} \Rightarrow a^3 = \frac{64}{1000}$$

$$a = \frac{4}{10} \Rightarrow a = 0.4$$

$$a = y - 0.8 \Rightarrow 0.4 = y - 0.8 \Rightarrow y = 1.2 \quad (\text{وهو عدد مولات } NO \text{ الابتدائية})$$

$$a = z - 0.4 \Rightarrow 0.4 = z - 0.4 \Rightarrow z = 0.8 \quad (\text{وهو عدد مولات } O_2 \text{ الابتدائية})$$

للتفاعل $2CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)} + O_{2(g)}$ وضع في اناء حجمه لتر $0.8mol$ من غاز CO_2 وعند وصول التفاعل الى حالة الاتزان وجد ان نصف كمية الغاز قد تفككت . احسب K_C .

العلاقة بين ثابتي الانزنان K_p و K_c

$$K_C = K_P(RT)^{-\Delta n_g}$$

$$K_P = K_C (RT)^{\Delta n_g}$$

القوانين

اما Δn_g فتحسب للغازات فقط وكالاتي :

$$\Delta n_g = \sum n_g (products) - \sum n_g (reactants)$$

سؤال

تتوقف علاقة K_P و K_C على قيمة Δn_g وضع ذلك .

(1) اذا كانت $\Delta n_g > 0$ (لها قيمة +) ، ، فإن : $K_P > K_C$

(2) اذا كانت $\Delta n_g < 0$ (لها قيمة -) ، ، فإن : $K_P < K_C$

(3) اذا كانت $\Delta n_g = 0$ ، ، فإن : $K_P = K_C$

افترض حصول الاتزان للتفاعل الاتي عند درجه حرارة $300K$:

$NH_4HS_{(s)} \rightleftharpoons NH_{3(g)} + H_2S_{(g)}$ ووجد ان قيم الضغوط الجزئية لكل من غازي النواتج عند حصول الاتزان تساوي $0.3atm$. احسب K_P و K_C للتفاعل .

(1) حساب K_P من الضغوط عند الاتزان : $K_P = P_{NH_3} \times P_{H_2S} = 0.3 \times 0.3 = 0.09$

(2) حساب Δn_g : $\Delta n_g = \sum n_g (products) - \sum n_g (reactants) = 2 - 0 = 2$

(3) حساب K_C من K_P : $K_C = K_P(RT)^{-\Delta n_g}$

$$K_C = 0.09(0.082 \times 300)^{-2} = \frac{0.09}{(24.6)^2} = \frac{0.09}{605.16} = 1.5 \times 10^{-4}$$

اذا كانت K_C تساوي 1.6 عند $1000C^\circ$ بالنسبة للتفاعل الاتي :

$C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$ احسب ضغط CO الجزئي في حالة الاتزان عندما يكون الضغط الجزئي لغاز CO_2 يساوي $0.6atm$.

نجد P_{CO} من K_P بعد ايجاده من K_C وكالاتي :

(1) حساب Δn_g : $\Delta n_g = \sum n_g (products) - \sum n_g (reactants) = 2 - 1 = 1$

(2) نجد $T(K)$: $T(K) = t(C^\circ) + 273 = 1000 + 273 = 1273K$

(3) نجد K_P من K_C : $K_P = K_C (RT)^{\Delta n_g} = 1.6 (0.082 \times 1273)^1 = 1.6(104.4) = 167$

(4) نجد P_{CO} : $K_P = \frac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}} \Rightarrow 167 = \frac{P_{CO}^2}{0.6} \Rightarrow P_{CO}^2 = 100 \Rightarrow P_{CO} = 10atm$

اذا كانت درجة تفكك مول واحد N_2O_4 الى NO_2 هي 20% عند درجة حرارة $27C^\circ$ وضغط $1atm$ وفي اناء حجمه لتر واحد . احسب قيمة K_P للتفاعل ..

(1) نجد تركيز N_2O_4 المتفكك (x) :

$$\% \text{ للتفكك} = \frac{[\text{المتفكك}]}{[\text{الابتدائي}]} \times 100 \Rightarrow 20 = \frac{x}{1} \times 100 \Rightarrow x = 0.2 \text{ mol/L}$$

(2) كتابة الجدول :

M	$N_2O_{4(g)}$	$\rightleftharpoons$	$2NO_{2(g)}$
التركيز الابتدائي	1		0
التغير في التركيز	$-x$		$+2x$
التركيز عند الأتزان	$1 - x$		$2x$

$$[N_2O_4] = 1 - x = 1 - 0.2 = 0.8 \text{ mol/L}$$

$$[NO_2] = 2x = 2(0.2) = 0.4 \text{ mol/L}$$

$$K_C = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{(0.4)^2}{0.8} = 0.2$$

(4) نجد K_C :

$$\Delta n_g = \sum n_g (\text{products}) - \sum n_g (\text{reactants}) = 2 - 1 = 1 \quad (5) \text{ نجد } K_P \text{ من } K_C :$$

$$T(K) = t(C^\circ) + 273 = 27 + 273 = 300K$$

$$K_P = K_C (RT)^{\Delta n_g} = 0.2 (0.082 \times 300)^1 = 4.92$$

وضع 4g من غاز HF في وعاء مغلق حجمه 2L عند درجة حرارة $27^\circ C$ وترك في الوعاء المغلق يتفكك حتى تم الأتزان الكيمائي حسب المعادلة الآتية :
 $2HF_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + F_{2(g)}$ فإذا كان K_P للتفاعل يساوي 1.21 . احسب الضغط الجزئي لغاز HF عند الأتزان علماً بأن الكتلة المولية للغاز تساوي 20 g/mol ($\sqrt{1.21} = 1.1$).

سؤال 26

المراجعة المركزة

$$T(K) = t(C^\circ) + 273 = 27 + 273 = 300K$$

$$n(\text{mol}) = \frac{m(g)}{M(g/\text{mol})} = \frac{4g}{20(g/\text{mol})} = 0.2 \text{ mol}$$

$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V} = \frac{(0.2 \times 0.082 \times 300)}{2} = 2.46 \text{ atm}$$

الضغط / atm	$2HF_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + F_{2(g)}$		
الضغط الابتدائي	2.46	0	0
التغير في الضغط	$-2x$	$+x$	$+x$
الضغط عند الأتزان	$2.46 - 2x$	x	x

$$K_P = \frac{P_{H_2} P_{F_2}}{P_{HF}^2} \Rightarrow 1.21 = \frac{x^2}{(2.46 - 2x)^2} \sqrt{\Rightarrow 1.1 = \frac{x}{2.46 - 2x}}$$

$$x = 2.7 - 2.2x \Rightarrow 3.2x = 2.7 \Rightarrow x = 0.85 \text{ atm}$$

$$P_{HF} = 2.46 - 2x = 2.46 - 2(0.85) = 2.46 - 1.70 = 0.76 \text{ atm}$$

أهمية ثابت الأتزان K_{eq}

(1) تحديد اتجاه التفاعل : يمكن توضيح ذلك كالآتي :



الخلاصة : (2017 / د 1 - ما هي العلاقة)

(1) إذا كانت قيمة K_{eq} كبيرة جداً ($K_{eq} \gg 1$)

فإن تركيز النواتج أكبر بكثير من تركيز المتفاعلات والتفاعل بالاتجاه الأمامي (→) .

(2) إذا كانت قيمة K_{eq} صغيرة جداً ($K_{eq} \ll 1$)

فأن تركيز المتفاعلات اكبر بكثير من تركيز النواتج والتفاعل بالاتجاه الخلفي (←).
 (3) اذا كانت قيمة K_{eq} تساوي الواحد الصحيح ($K_{eq} \cong 1$) التفاعل في حالة اتزان
 فأن تركيز النواتج يساوي تركيز المتفاعلات .

(2) بيان العلاقة بين ثابت الأتزان وطريقة كتابة المعادلة



القاعدة الاولى (اذا عكس اتجاه تفاعل ما فأن ثابت الأتزان الجديد يساوي مقلوب ثابت الأتزان الاول) اي : $K_{C2} = \frac{1}{K_{C1}}$.

القاعدة الثانية : (اذا ضربت معادلة تفاعل ما في رقم معين فأن ثابت الأتزان الجديد قيمة ثابت الأتزان الاول مرفوع الى اس يساوي ذلك المعامل) اي : $K_{C2} = (K_{C1})^{\text{الرقم}}$

للتفاعل $2NO_{2(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4(g)}$ ثابت الأتزان K_P له $0.39 =$ بدرجة حرارة $227C^\circ$ ،
 فما قيمة K_C للتفاعل $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ بدرجة الحرارة نفسها .

سؤال

(1) نجد K_{C1} للتفاعل الاول من K_{P1} وكالاتي : **(القاعدة الاولى)**

$$\Delta n_g = \sum n_g (\text{products}) - \sum n_g (\text{reactants}) = 1 - 2 = -1$$

$$T(K) = t(C^\circ) + 273 = 227 + 273 = 500K$$

$$K_C = K_P(RT)^{-\Delta n_g} = 0.39(0.082 \times 500)^{-(-1)} = 0.39(41)^1 = 16$$

(2) المعادلة الثانية هي عكس المعادلة الاولى : $K_{C2} = \frac{1}{K_{C1}} = \frac{1}{16} = 0.0625$

وضع مول واحد من بروميد الهيدروجين في وعاء مغلق حجمه لتر واحد وبدرجة حرارة معينة وصل التفاعل الغازي الى حالة الأتزان فوجد ان المتكون من غاز البروم $0.2mol$
 حسب التفاعل الاتي : $2HBr_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + Br_{2(g)}$ ، فما عدد مولات غاز HBr في خليط الأتزان لئلا اخر حجمه $1L$ الناتج من خليط غازي البروم والهيدروجين بكميات $2mol$ لكل منها .

سؤال

المطلوب ايجاد عدد مولات غاز HBr عند الأتزان للبناء الثاني ولكن بعد ايجاد ثابت الأتزان له (K_{C2}) من K_{C1} لتفاعل البناء الاول وكالاتي :

البناء الاول : نجد K_{C1} لتفاعل البناء الاول :

(1) نحسب المولارية للتركيز الابتدائية :

$$M = \frac{n(mol)}{v(L)} \Rightarrow [HBr] = \frac{1mol}{1L} = 1mol/L$$

M	$2HBr_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + Br_{2(g)}$			(2) كتابة الجدول :
التركيز الابتدائية	1	0.0	0.0	
التغير في التركيز	-2x	+x	+x	
التركيز عند الأتزان	1 - 2x	x	x	

(3) نجد قيمة x من تركيز Br_2 المتكون :

(ومنه نجد تركيز H_2 و HBr عند الامتزان)

$$[Br_2] = 0.2 = x \text{ mol/L}$$

$$[H_2] = x = 0.2 \text{ mol/L}$$

$$[HBr] = 1 - 2x = 1 - 2(0.2) = 1 - 0.4 = 0.6 \text{ mol/L}$$

$$K_{C1} = \frac{[H_2][Br_2]}{[HBr]^2} = \frac{(0.2)^2}{(0.6)^2} = \frac{1}{9}$$

(4) حساب K_C :

الاناء الثاني :

(1) نجد K_{C2} للاناء الثاني : (تفاعل الاناء الاول) $K_{C1} = \frac{1}{9}$

(تفاعل الاناء الثاني) $K_{C1} = ?$

بما ان التفاعل الثاني هو معكوس التفاعل الاول (القاعدة الثانية) لذا فإن : $K_{C2} = \frac{1}{K_{C1}} = \frac{1}{\frac{1}{9}} = 9$

(2) كتابة الجدول :

M	$H_{2(g)}$	$Br_{2(g)}$	$\rightleftharpoons$	$2HBr_{(g)}$
التركيز الابتدائية	2	2		0.0
التغير في التركيز	-x	-x		+2x
التركيز عند الامتزان	2 - x	2 - x		2x

(3) نجد قيمة x من K_{C2} :

$$K_{C2} = \frac{[HBr]^2}{[H_2][Br_2]} \Rightarrow 9 = \frac{(2x)^2}{(2-x)^2} \Rightarrow 3 = \frac{2x}{2-x} \Rightarrow x = 1.2 \text{ mol/L}$$

(4) نجد عدد مولات HBr المتكونة عند الامتزان : $[HBr] = 2x = 2(1.2) = 2.4 \text{ mol/L}$

$$n(\text{mol})HBr = 2.4 \text{ mol/L} \times 1L = 2.4 \text{ mol}$$

القاعدة الثالثة : (اذا كان التفاعل ناتجاً من مجموع عدد من التفاعلات فإن ثابت الامتزان للتفاعل الكلي يساوي

حاصل ضرب ثوابت الامتزان لكل التفاعلات التي ينتج عن مجموعها) . اي $K_C = K_{C1} \times K_{C2} \times \dots$

وجد ان ثابت الامتزان بدلالة الضغوط الجزئية K_P بدرجة حرارة $1000K$ للتفاعلات :

سؤال

$$1) \quad C_{(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} \quad K_{P1} = 2.5 \times 10^{10}$$

$$2) \quad C_{(s)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)} \quad K_{P2} = 5 \times 10^{20}$$

احسب ثابت الامتزان بدلالة K_C للتفاعل : $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{2(g)}$

(1) نجد K_P المعادلة الاولى تقلب وتضرب بالعدد 2 والمعادلة الثانية تضرب بالعدد 2 :

$$2CO_{(g)} \rightleftharpoons 2C_{(s)} + O_{2(g)} \quad K_{P1} = \frac{1}{(2.5 \times 10^{10})^2} = \frac{1}{625 \times 10^{18}}$$

$$2C_{(s)} + 2O_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{2(g)} \quad K_{P2} = (5 \times 10^{20})^2 = 25 \times 10^{40}$$

$$2CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{2(g)} \quad \text{بالجمع}$$

$$K_P = K_{P1} \times K_{P2} = \frac{1}{625 \times 10^{18}} \times 25 \times 10^{40} = 4 \times 10^{20}$$

(2) نجد K_C من K_P : $\Delta n_g = \sum n_g (\text{products}) - \sum n_g (\text{reactants}) = 2 - 3 = -1$

$$K_C = K_P (RT)^{-\Delta n_g} = 4 \times 10^{20} (0.082 \times 1000)^{-(-1)} = 3.28 \times 10^{22}$$

حاصل النفاعل Q

وهو قيمة افتراضية لثابت الانزان تحسب في لحظة ما خلال التفاعل للتنبؤ بوصوله الى حالة الانزان ويعبر عن حاصل التفاعل بنفس العلاقة المستعملة للتعبير عن ثابت الانزان ولكن لحاصل التفاعل لا تكون التراكيز المستخدمة بالضرورة هي قيم التراكيز عند حالة الانزان .

متى نجد Q ؟

سؤال

عندما يعطي في السؤال تراكيز المتفاعلات والنواتج ولا نعرف اتجاه التفاعل .

اهميته : التنبؤ بحالة الانزان او اتجاه سير التفاعل من خلال مقارنته مع K_c وحسب العلاقات الآتية :

- (1) اذا كان $K_c = Q$ فإن التفاعل في حالة انزان (اي تراكيز المتفاعلات والنواتج تبقى ثابتة) .
- (2) اذا كان $K_c > Q$ فإن التفاعل يتجه بالاتجاه الامامي (اي تراكيز النواتج اقل من تراكيزها في حالة الانزان)
- (3) اذا كان $K_c < Q$ فإن التفاعل يتجه بالاتجاه الخلفي (اي تراكيز النواتج اعلى من تراكيزها في حالة الانزان)

للتفاعل: $3H_{2(g)} + N_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$			
$[H_2]$	$[N_2]$	$[NH_3]$	
0.002	0.00001	0.001	1
0.354	0.000015	0.0002	2
0.01	5	0.0001	3

ثابت الانزان عند $500C^\circ$ هو 0.06

ادرس الحالات التالية وقرر اتجاه سير التفاعل

(علماً التراكيز معبر عنها بوحدة mol/L) :

نجد قيمة Q لكل حالة ونقارنها مع قيمة K_c للتنبؤ باتجاه سير التفاعل :

$$Q = \frac{[NH_3]^2}{[H_2]^3[N_2]} = \frac{(0.001)^2}{(0.002)^3(0.00001)} = 12.5 \times 10^6 \quad (1)$$

بما ان $K_c < Q$ ، لذا فالتفاعل يسير بالاتجاه الخلفي .

$$Q = \frac{[NH_3]^2}{[H_2]^3[N_2]} = \frac{(0.0002)^2}{(0.354)^3(0.000015)} = 0.06 \quad (2)$$


بما ان $K_c = Q$ ، لذا فالتفاعل في حالة انزان وتراكيز المواد ثابتة .

$$Q = \frac{[NH_3]^2}{[H_2]^3[N_2]} = \frac{(0.0001)^2}{(0.01)^3(5)} = 0.002 \quad (3)$$

بما ان $K_c > Q$ ، لذا فالتفاعل يسير بالاتجاه الامامي .

في وعاء مغلق حجمه لتر واحد يتفاعل غاز CO مع بخار الماء وتكون غاز CO_2 و H_2 بدرجة حرارة $700K$. ما تراكيز خليط الغازات عند وصولها الى حالة الانزان اذا تم وضع مول واحد من كل من المتفاعلات والنواتج علماً ان ثابت الانزان K_c لهذا التفاعل يساوي 5.29 .
($\sqrt{5.29} = 2.3$) .

(1) كتابة المعادلة الكيميائية :



(2) نجد حاصل التفاعل Q ويقارن مع K_c لمعرفة اتجاه التفاعل :

$$Q = \frac{[CO_2][H_2]}{[CO][H_2O]} = \frac{1 \times 1}{1 \times 1} = 1 \quad (M = n(mol))$$

بما ان $K_C > Q$ (5.29 > 1) لذلك فأن اتجاه التفاعل هو بالاتجاه الامامي

(3) نعمل جدولاً لنجد

قيمة x من K_C :

M	$CO_{(g)} + H_2O_{(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)} + H_{2(g)}$			
التركيز الابتدائية	1	1	1	1
التغير في التركيز	-x	-x	+x	+x
التركيز عند الامتزان	1-x	1-x	1+x	1+x

$$K_C = \frac{[CO_2][H_2]}{[CO][H_2O]} \Rightarrow 5.29 = \frac{(1+x)^2}{(1-x)^2} \sqrt{\Rightarrow} 2.3 = \frac{1+x}{1-x}$$

$$1+x = 2.3 - 2.3x \Rightarrow 3.3x = 1.3 \Rightarrow x = \frac{1.3}{3.3} = 0.394 \text{ mol/L}$$

(4) نجد التركيزات عند الامتزان :

$$[CO] = [H_2O] = 1-x = 1-0.394 = 0.606 \text{ mol/L}$$

$$[CO_2] = [H_2] = 1+x = 1+0.394 = 1.394 \text{ mol/L}$$

العلاقة بين الطاقة الحرة ΔG وقيمة حاصل التفاعل Q

$$\Delta G = \Delta G_r^0 + RT \ln Q$$

$$\Delta G_r^0 = -RT \ln K_{eq}$$

R - ثابت الغازات بوحدات الطاقة ويساوي $(R = 8.314 \frac{J}{K.mol})$ T - درجة الحرارة بالكلفن

مثال 13

إذا علمت ان ΔG^0 للتفاعل تساوي $\Delta G^0 = -104 \text{ KJ/mol}$ عند درجة حرارة 25°C و ضغط 1 atm $CCL_4(l) + H_{2(g)} \rightleftharpoons HCl(l) + CHCl_3(g)$ احسب ثابت الامتزان K_{eq} عند الظروف نفسها . (معلومة : $\log 1.7 = 0.26$).

(1) نحول درجة الحرارة من وحدة $^\circ \text{C}$ الى K : $T(K) = t(^{\circ}C) + 273 = 25(^{\circ}C) + 273 = 298 \text{ K}$

(2) يجب ملاحظة توحيد وحدات R مع ΔG^0 :

$$\Delta G_r^0 (J/mol) = -104 \text{ KJ/mol} \times \frac{1000(J)}{1(KJ)} = -104000 \text{ J/mol} \quad (\text{تلقائي})$$

$$\Delta G_r^0 = -RT \ln K_{eq}$$

(3) نجد K_{eq} من ΔG_r^0 :

$$-104000 \text{ J/mol} = -8.314 \text{ J/K.mol} \times 298 \text{ K} \times \ln K_{eq}$$

$$\ln K_{eq} = 42$$

$$2.3 \log K_{eq} = 42 \Rightarrow$$

$$K_{eq} = 10^{18.26} = 10^{0.26} \times 10^{18}$$

$$K_{eq} = 1.7 \times 10^{18}$$

وهذه القيمة كبيرة جداً ما يعني ان تراكيز النواتج كبيرة جداً وتراكيز المتفاعلات قليلة جداً (التفاعل امامي) والتفاعل شبه تام (اي تلقائي)

سؤال 33

وضح الفرق بين ΔG و ΔG^0 واكتب العلاقة بينهما . متى تكون قيمة ΔG تساوي ΔG^0 ، اثبت ذلك حسابياً ؟

الفرق هو : ΔG : الطاقة الحرة غير القياسية ، ΔG^0 : الطاقة الحرة القياسية

العلاقة هي : $\Delta G = \Delta G_r^0 + RT \ln Q$

$\Delta G = \Delta G_r^0 + RT \ln Q$: $\Delta G = \Delta G_r^0$ عندما $Q = 1$ لان $\ln 1 = 0$ وكالاتي :

$$\Delta G = \Delta G_r^0 + RT \ln 1$$

$$\Delta G = \Delta G_r^0 + RT(0)$$

$$\Delta G = \Delta G_r^0$$


قاعدة لوشايليه

قاعدة لوشايليه:

اذا اثر مؤثر خارجي مثل تغير التركيز او الحجم او الضغط او درجة الحرارة على تفاعل ما في حالة امتزان فان هذا التفاعل يتجه باتجاه الذي يقلل من تاثير ذلك المؤثر ليصل التفاعل الى حالة امتزان جديدة .

(2015 - 1د/خ ق - كيف يمكن زيادة الانتاج)

العوامل المؤثرة على حالة الامتزان (اي على اتجاه التفاعل) :



(1) اضافة المتفاعلات او سحب النواتج : يتجه التفاعل بالاتجاه الامامي .

(2) اضافة النواتج او سحب المتفاعلات : يتجه التفاعل بالاتجاه الخلفي .

(2) تأثير تغير الضغط والحجم :

(1) زيادة الضغط (او تقليل الحجم) : يتجه التفاعل نحو عدد المولات الغازية الاقل .

(2) تقليل الضغط (او زيادة الحجم) : يتجه التفاعل نحو عدد المولات الغازية الاكبر .

(3) تأثير درجة الحرارة : (1) بالتسخين يتجه التفاعل بالاتجاه الماص

(2) بالتبريد يتجه التفاعل بالاتجاه الباعث

(4) تأثير اضافة العامل المساعد : هو المادة التي تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون ان تشترك فيه .

سؤال : اضافة العامل المساعد الى تفاعل متزن لا يؤثر على تراكيز المواد في النظام ولا على موضع الامتزان ، علل ذلك ؟

لان العامل المساعد يؤثر على طاقة التنشيط فقط ، حيث يزيد من معدل سرعتي التفاعل الامامي R_f والخلفي R_b بالدرجة نفسها .

العوامل المؤثرة على قيمة ثابت الامتزان :

سؤال : عند ثبوت درجة الحرارة فان التغير في تراكيز مواد التفاعل او تغير الضغط او الحجم لا

تؤثر على قيمة K_{eq} ، علل ذلك ؟

لان قيمة النسبة بين تراكيز النواتج والمتفاعلات عند الامتزان تبقى ثابتة .

القاعدة : (1) عندما يتجه التفاعل بالاتجاه الامامي بتغير درجة الحرارة فان K_{eq} تزداد .

(2) عندما يتجه التفاعل بالاتجاه الخلفي بتغير درجة الحرارة فان K_{eq} تقل .



صف عدد من الاجراءات التي تؤدي الى رفع كمية C_2H_6 الناتجة من هذا التفاعل .

(1) اضافة كمية من المتفاعلات (غاز C_2H_4 و H_2) وسحب غاز C_2H_6 باستمرار من مزيج الامتزان .

(2) زيادة الضغط لكي يتجه نحو عدد المولات الاقل اي امامي نحو النواتج .

(3) تقليل الحجم (4) تبريد اناء التفاعل لان التفاعل الامامي باعث للحرارة .

مثال 15 ما تأثير كل العوامل التالية على حالة الانزان وثابت الانزان للتفاعل المتزن الاتي :



- (1) تسخين خليط الانزان .
- (2) سحب N_2F_4 من خليط الانزان عند ثبوت درجة الحرارة والحجم .
- (3) خفض الضغط على خليط الانزان متزن بدرجة حرارة ثابتة .
- (4) اضافة العامل المساعد الى خليط الانزان .

ت المؤثر	حالة الانزان	ثابت الانزان K_{eq}
1 تسخين خليط الانزان	يتجه بالاتجاه الامامي / وذلك لان التفاعل ماص وحيث التسخين يتجه باتجاه الماص للتخلص من الحرارة الفائضة حسب قاعدة لوشاتليه	يزداد/ لان التفاعل بالاتجاه الامامي فتزداد تركيز النواتج والعلاقة طردية بين K_{eq} وتركيز النواتج
2 سحب N_2F_4 من خليط الانزان	بالاتجاه الخلفي / لانه عند سحب N_2F_4 سوف يقل تركيزه في خليط الانزان لذلك سوف يتم تعويضه بتحول قسم N_2F_4 الى $2NF_2$	لا يتأثر
3 خفض الضغط	بالاتجاه الامامي / لان خفض الضغط يتجه نحو عدد المولات الاكبر اي نحو النواتج	لا يتأثر
4 اضافة العامل المساعد	لا تتأثر لانه يقلل من طاقة التنشيط فقط وتأثيره على سرعة التفاعل بكلا الاتجاهين متساوية	لا يتأثر

التفاعل الغازي المتزن الاتي : $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ انثالي التفاعل تساوي $92.5 KJ/mol$ ، ما تأثير كل من العوامل التالية على حالة الانزان وثابت الانزان :

- (1) خفض درجة الحرارة (2) اضافة زيادة من Cl_2 الى خليط الانزان (3) سحب PCl_3 من خليط الانزان (4) زيادة الضغط على خليط الانزان (5) اضافة عامل مساعد .

للتفاعل المتزن الاتي : $2SO_{3(g)} \rightleftharpoons 2SO_{2(g)} + O_{2(g)}$ وجد ان خليط الانزان بدرجة حرارة $25C^\circ$ يحتوي على : $[SO_3] = 0.002mol/L$ و $[SO_2] = 0.08mol/L$ و $[O_2] = 0.01mol/L$ وعند تبريد التفاعل الى $10C^\circ$ وجد K_c للتفاعل يساوي 4 بين هل التفاعل باعث باعثة ام ماص للحرارة .

$$K_c = \frac{[SO_2]^2[O_2]}{[SO_3]^2} = \frac{(0.08)^2(0.01)}{(0.002)^2} = 16$$

بما ان العملية تبريد وحيث ان التبريد يتجه نحو الباعث لكن نلاحظ ان قيمة K_c قلت اي التفاعل يتجه بالاتجاه الخلفي ، اي الخلفي قيمة الثابت باعث للحرارة والامامي ماص ، اذن التفاعل ماص للحرارة .

$t(C^\circ)$	K_c
25	16
10	4

تبريد

قلت قيمة الثابت

ملاحظة

عندما يقل كل من الثابت ودرجة الحرارة او يزداد كلاهما فالتفاعل ماص للحرارة والعكس صحيح .

املا الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها :

سؤال

(1) في التفاعل المتزن الاتي : $3H_{2(g)} + N_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)} + 92KJ$ فان خفض درجة الحرارة يؤدي الى زيادة تراكيز المواد الناتجة.

(2) في التفاعل المتزن الاتي : $CO + 2H_2 \rightleftharpoons CH_3OH + 127KJ$ عندما يضاف الهيدروجين الى هذا النظام المتزن فان حرارة التفاعل تزداد .

(3) عندما تكون K_p اصغر من K_c فأن مجموع عدد مولات المواد المتفاعلة أكبر من مجموع عدد مولات المواد الناتجة .

(4) عند تقليل الضغط في خليط متزن ($\Delta n_g = -1$) فالمتفاعل ينزاح نحو المتفاعلات وثابت الامتزان K_c لا يتغير .

(5) يترجح المتفاعل الخلفي لتفاعل متزن ماص للحرارة عند تبريد اناء التفاعل .

علل ما يأتي :

سؤال

(1) زيادة حجم اناء التفاعل لتفاعل غازي $\Delta n_g (products) < \Delta n_g (reactants)$ يؤدي الى خفض المنتج .

بما ان عدد مولات المتفاعلات اكبر من عدد مولات النواتج وحيث ان زيادة حجم اناء التفاعل يتجه نحو عدد المولات الاكبر (حسب القاعدة) اي نحو المتفاعلات (بالاتجاه الخلفي) فيقل المنتج

(2) في التفاعل الافتراضي المتزن : $A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + \text{طاقة}$ لا تتغير حرارة اناء التفاعل عند زيادة الضغط الكلي .

وذلك لان $\Delta n_g = 0$ ، فلا تأثير لزيادة الضغط على التفاعل .

(3) قيمة ثابت الامتزان للمتفاعلات غير الانعكاسية تكون كبيرة جداً .

وذلك لان المتفاعلات غير الانعكاسية تكون تامة اي تراكيز النواتج تكون كبيرة جداً وتراكيز المتفاعلات تكون صفر تقريباً وحيث ان : $K_c = \frac{[\text{نواتج}]}{[\text{متفاعلات}]}$ لذلك تكون قيمة K_c كبيرة .

(4) يعد التفاعل باعثاً للحرارة اذا انخفضت قيمة K_c للتفاعل عند زيادة درجة حرارة التفاعل .

بما ان زيادة درجة الحرارة (التسخين) يتجه التفاعل نحو الماص دائماً (حسب القاعدة) وان انخفاض قيمة K_c تدل ان التفاعل يتجه بالاتجاه الخلفي اي الخلفي هو الماص وان الامامي هو الباعث .

(5) قيمة K_c تزداد عند رفع درجة حرارة التفاعل في حالة المتفاعلات الماصة للحرارة .

بما ان رفع درجة الحرارة يتجه باتجاه الماص دائماً (حسب القاعدة) وحيث ان التفاعل الامامي ماص للحرارة اي يتجه بالاتجاه الامامي نحو النواتج فتزداد قيمة K_c .

(6) زيادة الضغط على خليط متوازن ($\Delta n_g = +1$) فأن الامتزان ينزاح باتجاه المتفاعلات .

بما ان Δn_g موجبة فأن عدد مولات المتفاعلات اقل وحيث ان زيادة الضغط يتجه نحو عدد المولات الاقل (حسب القاعدة) اي نحو المتفاعلات .

(7) تتوقف بعض المتفاعلات تماماً بينما تظهر تفاعلات اخرى وكأنها متوقفة .

المتفاعلات التي تتوقف هي تفاعلات غير انعكاسية اي تامة وتتوقف عندما يستهلك احد المواد المتفاعلة او جميعها ، اما التفاعلات التي تبدو وكأنها متوقفة فهي التفاعلات الانعكاسية حيث تكون سرعة التفاعل الامامي تساوي سرعة التفاعل الخلفي ولكنها مستمرة في كلا الاتجاهين .

(8) ترتفع درجة حرارة تفاعل ماص للحرارة عندما $K_c = 0.3$ و $Q = 1$.

بما ان ($K_c < Q$) فأن التفاعل يتجه بالاتجاه الخلفي الباعث للحرارة (لان الامامي ماص) لذلك ترتفع درجة حرارة التفاعل .

(9) في التفاعل المتزن الاتي : $SO_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons SO_{2(g)} + Cl_{2(g)}$ طاقة ترتفع حرارة التفاعل عند اضافة SO_2 الى خليط الامتزان .

بما ان اضافة SO_2 يتجه بالاتجاه الخلفي (حسب القاعدة اضافة نواتج يتجه نحو المتفاعلات) وبما ان التفاعل الخلفي باعث للحرارة فيؤدي الى ارتفاع حرارة التفاعل .

المواد غير الالكتروليتية:

وهي المواد التي تكون محاليلها المائية غير موصلة للتيار الكهربائي رغم ذوبانها في الماء ، أي انها لا تتفكك أي لا تعطي ايونات سالبة وايونات موجبة ، مثال السكروز وخلات المثل .

المواد الالكتروليتية:

وهي المواد التي يكون لمحاليلها المائية او لمنصهرها القابلية على توصيل التيار الكهربائي أي تتفكك لتعطي ايونات موجبة وسالبة ، وتشمل الحوامض والقواعد والاملاح ، وتعد الحوامض والقواعد مركبات مستقطبة اما الاملاح فهي ايونية

اصنافها:

1 (الالكتروليتات القوية:

وهي المواد التي تكون عالية التوصيل للكهربائية عند ذوبانها في الماء ، وذلك بسبب تفككها التام الى ايونات ومعادلات التفكك لها غير انعكاسية ، وتشمل الحوامض القوية والقواعد القوية والاملاح تامة الذوبان

الحوامض القوية

(1 حامض الهيدروكلوريك

(2 حامض الهيدروبروميك

(3 حامض النتريك

(4 حامض الكبريتيك








القواعد القوية

(1 هيدروكسيد الصوديوم

(2 هيدروكسيد البوتاسيوم

(3 هيدروكسيد الباريوم

(4 هيدروكسيد الكالسيوم



كيف تحسب تراكيز الايونات للالكتروليتات القوية في محاليلها المائية ؟


سؤال

وذلك بصورة مباشرة من تراكيز الالكتروليتات القوية .

احسب التراكيز المولارية لايون Ba^{2+} وايون OH^- في محلول (0.03 M) من هيدروكسيد الباريوم .

مثال 1

نكتب معادلة تفكك القاعدة القوية $Ba(OH)_2$ وهو تفكك تام :



التركيز الابتدائي 0.03 M 0 0

التغير في التركيز -0.03 M +0.03 M +2(0.03) M

التركيز النهائي 0 0.03 M 0.06 M

∴ تراكيز الايونات هي : $[Ba^{2+}] = 0.03 M$ ، $[OH^-] = 0.06 M$

2 (الاالكتروليتات الضعيفة:

وهي الاالكتروليتات التي تكون محاليلها المائية ضعيفة التوصيل للكهربائية لكونها تتأين بشكل جزئي (غير تام) عند ذوبانها في الماء , ولها تفاعلات انعكاسية , وتشمل الحوامض الضعيفة والقواعد الضعيفة والاملاح شحيحة الذوبان .

الحوامض الضعيفة:

- (1) حامض الخليك $CH_3COOH_{(aq)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$
- (2) حامض الهيدروسيانيك $HCN_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + CN^-_{(aq)}$
- (3) حامض النتروز $HNO_{2(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + NO^-_{2(aq)}$
- (4) حامض الهيدروفلوريك $HF_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + F^-_{(aq)}$
- (5) حامض الفينول $C_6H_5OH_{(aq)} \rightleftharpoons C_6H_5O^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$

القواعد الضعيفة:

- (1) الامونيا $NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH^+_{4(aq)} + OH^-_{(aq)}$
- (2) الانيلين (او C_6H_7N) $C_6H_5NH_{2(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_6H_5NH^+_{3(aq)} + OH^-_{(aq)}$
- (3) البريديين $C_5H_5N_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons C_5H_5NH^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

الحوامض الضعيفة:

الحسابات: (والقواعد الضعيفة نفس القوانين)

- (1) يمكن حساب تركيز H^+ للحامض الضعيف من قانون K_a على ان تكون قيمة K_a معلومة و تركيز الحامض عند الاتزان معلوم كما في القانون العام :

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

درجة التأين = $\frac{\text{تركيز الجزء المتأين عند الاتزان}}{\text{التركيز الابتدائي}}$

- (2) حساب درجة التفكك (التأين) :

درجة التأين:

وهي نسبة التركيز المولاري للجزء المتأين من الاالكتروليت الضعيف الى التركيز المولاري للاالكتروليت الضعيف .


- (3) النسبة المئوية للتأين = $\frac{\text{تركيز الجزء المتأين عند الاتزان}}{\text{التركيز الابتدائي}} \times 100$

$$\% \text{ للتأين} = \text{درجة التأين} \times 100$$

احسب تركيز ايون المائي H^+ في 0.1 M محلول مائي لحامض الخليك ودرجة التاين النسبة المئوية لتفكك الحامض ، اذا علمت ان ثابت تفكك حامض الخليك 1.8×10^{-5}

$$(\sqrt{1.8} = 1.3)$$

- (1) كتابة المعادلة الكيميائية المتوازنة لتفكك الحامض الضعيف :



وبما ان قيمة K_a صغيرة لذلك فان قيمة x تهمل اي يصبح تركيز الحامض عند الاتزان هو : $0.1 - x \cong 0.1 \text{ M}$ اي نستخدم طريقة التقريب .

(2) نحسب تركيز H^+ (x) من قانون K_a : $1.8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0.1}$ $\Rightarrow$ $K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$

$x^2 = 1.8 \times 10^{-6}$ $\sqrt{} \Rightarrow x = 1.3 \times 10^{-3} \text{ M} = [H^+]$

(3) درجة التأين : $0.013 = \frac{1.3 \times 10^{-3}}{0.1} = \frac{\text{تركيز الجزء المتأين عند الاتزان}}{\text{التركيز الابتدائي}} = \text{درجة التأين}$

(4) % للتأين : $100 \times \frac{\text{تركيزايون } H^+ \text{ عند الاتزان}}{\text{التركيز الابتدائي للحامض}} = \text{النسبة المئوية للتأين}$

$\%1.3 = 100 \times \frac{1.3 \times 10^{-3}}{0.1} = \text{النسبة المئوية للتأين}$

احسب تركيز ايون الهيدروجين المائي في المحلول المائي للفينول (C_6H_5OH) ($K_a = 1.3 \times 10^{-10}$) الذي تركيزه (أ) 0.2 M (ب) بعد تخفيفه لمئة مرة . (2017 د/ 1 - 0.3 M)

تمرين 3

أ (لمحلول تركيزه 0.2 M : $C_6H_5OH_{(aq)} \rightleftharpoons C_6H_5O^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$


التركيز الابتدائية	0.2 M	0	0
التركيز عند الاتزان	$(0.2 - x) \text{ M}$	$x \text{ M}$	$x \text{ M}$

$K_a = \frac{[C_6H_5O^-][H^+]}{[C_6H_5OH]} \Rightarrow 1.3 \times 10^{-10} = \frac{x^2}{0.2}$

$x^2 = 26 \times 10^{-12}$ $\sqrt{} \Rightarrow x = 5.1 \times 10^{-6} \text{ M} = [H^+]$

(ب) بعد تخفيفه لمئة مرة : الطريقة الاولى : نجد تركيز الحامض بعد التخفيف من القانون الاتي :

$\frac{M_1}{M_2} = 100 \Rightarrow M_2 = \frac{0.2}{100} = 0.002 \text{ M}$ عدد مرات التخفيف = $\frac{\text{تركيز الحامض قبل التخفيف}}{\text{تركيز الحامض بعد التخفيف}}$



التركيز الابتدائية	0.002 M	0	0
التركيز عند الاتزان	$(0.002 - x) \text{ M}$	$x \text{ M}$	$x \text{ M}$

$K_a = \frac{[C_6H_5O^-][H^+]}{[C_6H_5OH]} \Rightarrow 1.3 \times 10^{-10} = \frac{x^2}{0.002}$

$x^2 = 26 \times 10^{-14}$ $\sqrt{} \Rightarrow x = 5.1 \times 10^{-7} \text{ M} = [H^+]$

سؤال

تزداد درجة تفكك الالكتروليت الضعيف عند التخفيف ، علل ذلك ؟

وذلك لان عملية التخفيف تؤدي الى ازاحة موقع الاتزان من موقعه الاصلي الى موقع جديد لازالة تأثير عملية التخفيف حسب لوشاتليه اي ان عملية التخفيف تؤدي الى نقصان في كمية الجزء غير المتفكك من الحامض وتزيد من كمية الجزء المتفكك اي H^+ في وحدة الحجم من المحلول ليرجع الى حالة اتزان جديدة .

اذا علمت ان النسبة المئوية للتفكك 0.1 M حامض الهيدروسيانيك HCN تساوي

$100 \times \frac{\text{تركيزايون } H^+ \text{ عند الاتزان}}{\text{التركيز الابتدائي للحامض}} = \text{\% التأين}$

$0.01 \text{ \%}$ ، كم هو ثابت تايين هذا الحامض ؟

(1) نجد تركيز ايون $[H^+]$ من % للتأين :

$\% 0.01 = \frac{[H^+]}{0.1} \times 100 \Rightarrow [H^+] = 1 \times 10^{-5} \text{ M}$

سؤال

(2) نجد K_a من $[H^+]$ و مولارية الحامض :



$$K_a = \frac{[H^+][CN^-]}{[HCN]} = \frac{(1 \times 10^{-5})^2}{0.1} = 1 \times 10^{-9}$$

القواعد الضعيفة:

احسب تركيز ايون الهيدروكسيد $[OH^-]$ ودرجة التأين والنسبة المئوية للتأين للمحلول المائي للامونيا الذي تركيزه يساوي 0.2 M ، علماً ثابت تفكك القاعدة الضعيفة

$$K_b(NH_3) = 1.8 \times 10^{-5}$$



التركيز الابتدائية 0.2 M 0 0

التركيز عند الاتزان (0.2 - x) M x M x M

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} \Rightarrow 1.8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0.2}$$

$$x^2 = 3.6 \times 10^{-6} \quad \sqrt{\quad} \Rightarrow x = 1.9 \times 10^{-3} M = [OH^-]$$

$$0.0095 = \frac{1.9 \times 10^{-3}}{0.2} = \frac{\text{تركيزايون } OH^- \text{ عند الاتزان}}{\text{التركيزالابتدائي للقاعدة}} = \text{درجة التأين}$$

النسبة المئوية للتأين = درجة التأين $\times 100$

$$\% 0.95 = 100 \times 0.0095 = \text{النسبة المئوية للتأين}$$

حامض برونشند:

هو المادة التي لها القابلية على فقدان بروتون (H^+) وتكوين قاعدة قرينة .

قاعدة برونشند:

وهي المادة التي لها القابلية على اكتساب بروتون (H^+) وتكوين حامض قرين .

القاعدة القرينة:

هي حامض برونشند بعد فقدانه للبروتون ، مثال CH_3COO^- ، Cl^-

الحامض القرين:

هو قاعدة برونشند بعد اكتسابها للبروتون ، مثال H_3O^+ ، NH_4^+ .

سؤال

علام تعتمد قوة الحامض او القاعدة حسب نظرية برونشند - لوري ؟ عدد ذلك .

- تعتمد قوة الحامض حسب نظرية برونشند على مدى قابلية الحامض على فقدان البروتون H^+ .
- تعتمد قوة القاعدة حسب نظرية برونشند على مدى قابلية القاعدة على اكتساب البروتون H^+ .
- تعتمد على الوسط الذي يحتوي هذه الاصناف .

التأين الذاتي للماء:

التأين الذاتي للماء:

هو تفاعل كيميائي ينتقل فيه بروتون من جزي ماء الى جزي ماء اخر لتكوين ايونات الهيدرونيوم H_3O^+ وايونات الهيدروكسيد OH^- وبأعداد متساوية ويسمى ايضاً بالتفكك التلقائي للماء او البرتنة الذاتية للماء وهي المسؤولة عن الصفة الامفوتيرية للماء . لتنتج العلاقة الآتية :

$$[H^+] \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$



مثال الماء والاملاح المتعادلة	المحلول متعادل	الحالة العامة $[H^+] = [OH^-]$	عند $25C^0$ $[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7} M$
الحوامض والاملاح الحامضية	حامضي	$[H^+] > [OH^-]$	$[OH^-] < 1 \times 10^{-7} , [H^+] > 1 \times 10^{-7}$
القواعد والاملاح القاعدية	قاعدي	$[H^+] < [OH^-]$	$[OH^-] > 1 \times 10^{-7} , [H^+] < 1 \times 10^{-7}$

احسب تراكيز ايونات H^+ و OH^- في $0.05 M$ من محلول حامض النتريك (HNO_3) .

مثال 6



$HNO_{3(aq)}$	$\longrightarrow$	$H^+_{(aq)}$	+	$NO_{3(aq)}^-$	
0.05 M		0		0	التركيز الابتدائي
-0.05 M		+0.05 M		+0.05 M	التغير في التركيز
0		0.05 M		0.05 M	التركيز النهائي

$$[H^+] = 0.05 M$$

∴ تراكيز الايونات هي

$$[H^+] \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$0.05 \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14} \Rightarrow [OH^-] = 2 \times 10^{-13} M$$

الاس الهيدروجيني PH:

الاس الهيدروجيني PH:



هي طريقة ملائمة لقياس او للتعبير عن تركيز ايون الهيدروجين خصوصاً لتراكيز ايون الهيدروجين الصغيرة التي تكون قيمتها اصغر او تساوي $1 M$ بدلالة سالب لوغاريتم التركيز المولاري لايون الهيدروجين في المحلول ويرمز له PH .

$$PH = -\log[H^+]$$

$$POH = -\log[OH^-]$$

$$PH + POH = 14$$



احسب قيم $[H^+]$ و PH و $[OH^-]$ و POH للمحلول المائي لـ $Ca(OH)_2$ تركيزه $0.015 M$. هل المحلول حامضي ام قاعدي ؟ ولماذا ؟ ($\log 3 = 0.48$) .

تمرين 9

$Ca(OH)_{2(aq)}$	$\longrightarrow$	$Ca^{2+}_{(aq)}$	+	$2OH^-_{(aq)}$	
0.015 M		0		0	التركيز الابتدائي
-0.015 M		+0.015 M		+2(0.015) M	التغير في التركيز
0		0.015 M		0.03 M	التركيز النهائي

$$[OH^-] = 0.03 M$$

$$(1) [OH^-]$$

$$[H^+] \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14} \Rightarrow [H^+] \times 0.03 = 1 \times 10^{-14}$$

$$(2) [H^+]$$

$$[H^+] = \frac{1 \times 10^{-14}}{0.03} = 3.3 \times 10^{-13} M$$

$$POH = -\log[OH^-] = -\log 0.03 = -\log(3 \times 10^{-2})$$

$$(3) POH$$

$$POH = -\log 3 - \log 10^{-2} = -0.48 + 2 = 1.52$$

$$PH + POH = 14$$

$$PH + 1.52 = 14 \Rightarrow PH = 14 - 1.52 = 12.48$$

PH (4)

معكوس او مقلوب اللوغاريتم : اي ايجاد العدد اذا علم لوغاريتمه :

$$PH = -\log[H^+] \Rightarrow [H^+] = 10^{-PH} \quad \text{القانون :}$$

$$POH = -\log[OH^-] \Rightarrow [OH^-] = 10^{-POH}$$

كم هي كتلة هيدروكسيد البوتاسيوم ($M = 56g/mol$) اللازم اضافتها الى 200ml من الماء لتصبح قيمة PH المحلول الناتج تساوي 11 ؟

سؤال 25

$$PH + POH = 14 \Rightarrow POH = 14 - 11 = 3 \quad \text{(1) نجد POH من PH :}$$

$$[OH^-] = 10^{-POH} = 10^{-3} M \quad \text{(2) نجد } [OH^-] :$$



$$m(g) = M (mol/L) \times M(g/mol) \times V(L) \quad \text{(4) نجد كتلة القاعدة :}$$

$$m(g) = 10^{-3} mol/L \times 56g/mol \times 200ml \times \frac{1L}{1000ml} = 0.0112g$$

الأمـ ذوب

الأمـ ذوب

هو تفاعل المادة (المذاب) مع المذيب المستعمل لاذابتها .


الذـال المائي:

هو تفاعل المادة (المـ) مع الماء عندما يكون الماء هو المذيب اي مع ايونات H^+ و OH^-

الامـ

(1) مـ مشتق من حامض قوي وقاعدة قوية :


وهي الامـ التي تتكون من الايون السالب للحامض القوي و الايون الموجب للقاعدة القوية ، كما في المحلول المائي لمـ كلوريد الصوديوم ($NaCl$) مـ مشتق من الحامض HCl والقاعدة $NaOH$ ، وعند ذوبانه في الماء فأن محلوله المائي يكون متعادلاً بسبب ان الايونات الناتجة (Na^+ و Cl^-) هي قرائن ضعيفة لا تتفاعل مع الماء فيبقى تركيز H^+ يساوي تركيز OH^- ويساوي $M \times 10^{-7}$ لكل منهما و PH للمحلول يساوي 7 وكالاتي :



سؤال تكون المحاليل المائية لامـ الحوامض القوية والقواعد القوية متعادلة ، علـ ذلك ؟

بسبب ان الايونات الناتجة للحامض القوي والقاعدة القوية هي قرائن ضعيفة لا تتفاعل مع الماء فيبقى تركيز H^+ يساوي تركيز OH^- ويساوي $M \times 10^{-7}$ لكل منهما و PH للمحلول يساوي 7 .

(2) ملح مشتق من قاعدة قوية و حامض ضعيف : مثال ملح خلات الصوديوم



$$K_h = \frac{K_w}{K_a}$$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_w \times K_a}{C}}$$

$$PH = \frac{1}{2} [PK_w + PK_a + \log c]$$

القوانين :

احسب قيمة PH لمحلول لملاح خلات الصوديوم تركيزه 0.01 M في درجة حرارة 25°C ،
 علماً بأن قيمة $K_a(CH_3COOH) = 1.8 \times 10^{-5}$. $(\log 1.8 = 0.26)$.


$$PK_a = -\log K_a = -\log 1.8 \times 10^{-5} = -\log 1.8 - \log 10^{-5} : PK_a \text{ نجد}$$

$$= -0.26 + 5 = 4.74$$

$$PH = \frac{1}{2} [PK_w + PK_a + \log c] = \frac{1}{2} [14 + 4.74 + \log 10^{-2}] : PH \text{ نجد}$$

$$PH = \frac{1}{2} [18.74 - 2] = \frac{1}{2} (16.74) = 8.37$$

احسب تركيز ايون الهيدروكسيد للمحلول المائي لملاح سيانيد البوتاسيوم KCN
 تركيزه 0.1 M $K_a(HCN) = 4.9 \times 10^{-10}$. هل المحلول حامضي ام قاعدي ؟



$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_w \times K_a}{C}}$$

(2) نجد $[H^+]$ من قانون الجذر :

$$[H^+] = \sqrt{\frac{(1 \times 10^{-14}) \times (4.9 \times 10^{-10})}{0.1}} = \sqrt{49 \times 10^{-24}} = 7 \times 10^{-12} \text{ M}$$

(3) نجد $[OH^-]$:

$$[H^+] \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14} \Rightarrow 7 \times 10^{-12} \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$[OH^-] = \frac{1 \times 10^{-14}}{7 \times 10^{-12}} = 1.43 \times 10^{-3} \text{ M} \quad , \quad [OH^-] > [H^+] \text{ والمحلول قاعدي لان}$$

ما قيمة ثابت التحلل المائي لملاح خلات الصوديوم CH_3COONa اذا علمت ان 1L منه
 بتركيز 0.2 M يحتوي على تركيز ايونات H^+ يساوي $1 \times 10^{-9} \text{ M}$ ؟

عند اضافة املاح مشتقة من قواعد قوية وحوامض ضعيفة في الماء يكون المحلول ذا
 صفة قاعدية دائماً ، علل ذلك ؟

وذلك لان ذوبان هذا النوع من الاملاح في الماء سوف ينتج قاعدة قرينة قوية (ناتجة من الحامض الضعيف) والتي
 تتفاعل مع الماء (تكتسب H^+ من الماء) فيقل تركيز H^+ ويزداد تركيز OH^- فيصبح المحلول قاعدياً .

(3) ملح مشتق من حامض قوي وقاعدة ضعيفة :

مثال ملح كلوريد الامونيوم NH_4Cl :



تفاعل الايون الموجب

$$K_h = \frac{K_w}{K_b}$$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_w \times C}{K_b}}$$

$$PH = \frac{1}{2} [PK_w - PK_b - \log c]$$

القوانين :



سؤال املا الفراغات : PH لملاح يساوي (5) وتركيزه $0.1 M$ فان $K(b)$ له يساوي 10^{-5}

بما ان PH للملاح اقل من 7 لذلك فالملاح حامضي :

$$M[H^+] = 10^{-PH} = 10^{-5} \quad [H^+] = \sqrt{\frac{K_w \times C}{K_b}} \Rightarrow 10^{-5} = \sqrt{\frac{10^{-14} \times 0.1}{K_b}}$$

$$10^{-5} = \sqrt{\frac{10^{-15}}{K_b}} \Rightarrow 10^{-10} = \frac{10^{-15}}{K_b} \Rightarrow K_b = 10^{-5}$$

سؤال احسب قيمة POH لمحلول نترات الامونيوم ($PK_b = 4.74$) بتركيز $0.5 M$ ، وهل المحلول حامضي ام قاعدي . ($\log 5 = 0.7$)



(1) كتابة المعادلات :



$$PH = \frac{1}{2} [PK_w - PK_b - \log c] = \frac{1}{2} [14 - 4.74 - \log 0.5]$$

(2) تطبيق قانون PH :

$$PH = \frac{1}{2} [9.26 - \log 5 \times 10^{-1}] = \frac{1}{2} [9.26 - \log 5 - \log 10^{-1}]$$

$$PH = \frac{1}{2} [9.26 - 0.7 + 1] = \frac{1}{2} (9.56) = 4.78 \quad (PH < 7 \text{ للمحلول حامضي لان})$$

$$PH + POH = 14 \Rightarrow POH = 14 - 4.78 = 9.22 \quad (3) \text{ نجد } POH :$$

سؤال



تكون المحاليل المائية لاملاح القواعد الضعيفة والحوامض القوية ذات صفات حامضية ، علل ذلك ؟

وذلك لان ذوبان هذا النوع من الاملاح في الماء سوف ينتج حامض قرين قوي (ناتج من القواعد الضعيفة) والذي يتفاعل مع الماء (تكتسب OH^- من الماء) فيقل تركيز OH^- ويزداد تركيز H^+ فيصبح المحلول حامضياً .

الايون المشترك

الايون المشترك



هي ظاهرة تقليل تفكك الالكتروليت الضعيف الناتجة عن وجود الكتروليت قوي يحوي احد ايونات الالكتروليت الضعيف في نفس المحلول ويسمى المحلول الناتج بالمحلول البفري .

انواعه : (1) حامض ضعيف وملحه (مثال CH_3COONa و CH_3COOH)

(2) قاعدة ضعيفة وملحها (مثال NH_4Cl و NH_3)

القوانين :

$$[H^+] = K_a \times \frac{[acid]}{[salt]}$$

$$PH = PK_a + \log \frac{[salt]}{[acid]}$$

(1) الحامض الضعيف وملحه :

$$[OH^-] = K_b \times \frac{[base]}{[salt]}$$


$$POH = PK_b + \log \frac{[salt]}{[base]}$$

(2) القاعدة الضعيفة وملحها :

احسب تركيز ايون H^+ و PH لمحلول مكون من مزيج من $0.1 M$ حامض الخليك و M 0.2 خلات الصوديوم . $(\log 3 = 0.48)$ $K_a(CH_3COOH) = 1.8 \times 10^{-5}$

المحلول ايون مشترك مكون من حامض ضعيف وملحه :

(1) كتابة المعادلات :



$$[H^+] = K_a \times \frac{[acid]}{[salt]} = 1.8 \times 10^{-5} \times \frac{0.1}{0.2} = 9 \times 10^{-6}$$

(2) نجد $[H^+]$:

$$PH = -\log[H^+] = -\log 9 \times 10^{-6} = -\log 9 - \log 10^{-6}$$

(3) نجد PH :

$$PH = -\log 3^2 - \log 10^{-6} = -2(0.48) + 6 = -0.96 + 6 = 5.04$$

ويمكن إيجاد PH من العلاقة $PH = PK_a + \log \frac{[salt]}{[acid]}$ عندما يعطي $\log 2$ و $\log 1.8$.

ما عدد غرامات CH_3COOH ($M = 60 g/mol$) الواجب اضافتها الى $400 ml$ من الماء المقطر ليصبح PH المحلول بعد الاضافة 2.7 ؟ ثم احسب PH المحلول الناتج بعد اضافة $0.1 M$ خلات الصوديوم CH_3COONa الى محلول الحامض علماً PK_a للحامض $\log 2 = 0.3$ ، $4.7 =$

$$[H^+] = 10^{-PH} = 10^{-2.7} = 10^{-2.7+3-3} = 10^{0.3} \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-3} M : \text{نجد } [H^+] \text{ من } PH$$

$$K_a = 10^{-PK_a} = 10^{-4.7} = 10^{-4.7+5-5} = 10^{0.3} \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-5} : \text{نجد } K_a \text{ من } PK_a$$

$$CH_3COOH_{(aq)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H^+_{(aq)} : \text{نجد مولارية الحامض } M \text{ من } K_a \text{ و } [H^+]$$

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} \Rightarrow 2 \times 10^{-5} = \frac{(2 \times 10^{-3})^2}{[CH_3COOH]}$$

$$[CH_3COOH] = \frac{4 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-5}} = 0.2 M$$

$$M = \frac{m(g)}{M(g/mol)} \times \frac{1}{V(L)}$$

(4) نجد غرامات الحامض من المولارية M :

$$m(g) = M \times M \times V \Rightarrow m(g) = 0.2 \times 60 \times 400 ml \times \frac{1L}{1000ml} = 4.8g$$

$$PH = PK_a + \log \frac{[salt]}{[acid]} \Rightarrow PH = 4.7 + \log \frac{0.1}{0.2}$$

(5) PH بعد الاضافة :

$$PH = 4.7 + \log \frac{1}{2} \Rightarrow PH = 4.7 + \log 1 - \log 2$$

$$PH = 4.7 + 0 - 0.3 \Rightarrow PH = 4.4$$

ما تركيز حامض الخليك في محلول يحوي اضافة الى الحامض ملح خلات الصوديوم

بتركيز $0.3 M$ اذا علمت ان قيمة PH المحلول كانت تساوي 4.31 . $K_a(CH_3COOH) = 1.8 \times 10^{-5}$ ($\log 3.7 = 0.57$)

سؤال

سؤال 18

المراجعة المركزة

واجب

ما هو التأثير الناتج من اضافة 26.75 g (0.5 mol) من ملح كلوريد الامونيوم الى لتر واحد من محلول الامونيا بتركيز 0.1 M على درجة تفكك القاعدة ؟ اذا علمت ان ثابت تفكك القاعدة الضعيفة $K_b(\text{NH}_3) = 1.8 \times 10^{-5}$.

(1) نحسب درجة تفكك القاعدة الضعيفة (الامونيا) قبل اضافة الملح : $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$

التركيز الابتدائي	0.1 M	0	0
التركيز عند الاتزان	$(0.1 - x) \text{ M}$	$x \text{ M}$	$x \text{ M}$

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} \Rightarrow 1.8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0.1}$$

$$x^2 = 1.8 \times 10^{-6} \quad \sqrt{\quad} \Rightarrow x = 1.3 \times 10^{-3} \text{ M} = [\text{OH}^-]$$

$$0.013 = \frac{1.3 \times 10^{-3}}{0.1} = \frac{\text{تركيز ايون } \text{OH}^- \text{ عند الاتزان}}{\text{التركيز الابتدائي للقاعدة}} = \text{درجة التأين}$$

(2) نحسب درجة التفكك للامونيا بعد اضافة الملح (ايون مشترك) : $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$



$$[\text{OH}^-] = K_b \times \frac{[\text{base}]}{[\text{salt}]} \quad [\text{OH}^-] = 1.8 \times 10^{-5} \times \frac{0.1}{0.5} = 3.6 \times 10^{-6}$$

$$3.6 \times 10^{-5} = \frac{3.6 \times 10^{-6}}{0.1} = \frac{\text{تركيز ايون } \text{OH}^- \text{ عند الاتزان}}{\text{التركيز الابتدائي للقاعدة}} = \text{درجة التأين}$$

$$361 = \frac{0.013}{3.6 \times 10^{-5}} = \frac{\text{درجة التفكك}}{2 \text{ درجة التفكك}} = \text{عدد مرات الانخفاض في درجة التفكك}$$

احسب كتلة كلوريد الامونيوم ($M = 53.5 \text{ g/mol}$) الواجب اضافتها الى 500 ml من محلول 0.15 M امونيا لجعل قيمة PH المحلول تساوي 9.0 . علماً ان ثابت تفكك الامونيا 1.8×10^{-5} . $\log 1.8 = 0.26$.

المحلول ايون مشترك مكون من قاعدة ضعيفة وملحها :

$$\text{PH} + \text{POH} = 14 \Rightarrow \text{POH} = 14 - 9 = 5 \quad \text{نجد } \text{POH} \text{ من } \text{PH} :$$

$$\text{PK}_b = -\log K_b = -\log 1.8 \times 10^{-5} \quad \text{نجد } \text{PK}_b :$$

$$\text{PK}_b = -\log 1.8 - \log 10^{-5} = -0.26 + 5 = 4.74$$

$$\text{POH} = \text{PK}_b + \log \frac{[\text{salt}]}{[\text{base}]} \quad \text{نجد تركيز الملح من قانون الايون المشترك} :$$

$$5 = 4.74 + \log \frac{[\text{salt}]}{0.15}$$

$$\log \frac{[\text{salt}]}{0.15} = 0.26$$

$$\log \frac{[\text{salt}]}{0.15} = \log 1.8$$

$$\frac{[\text{salt}]}{0.15} = 1.8 \Rightarrow [\text{salt}] = 0.27 \text{ M}$$

او الحل بطريقة معكوس اللوغارتم:

$$\log \frac{[\text{salt}]}{0.15} = 0.26$$

$$\frac{[\text{salt}]}{0.15} = 10^{0.26} = 1.8$$

(4) نجد كتلة الملح من المولارية :

$$m(g) = M \text{ (mol/l)} \times M(g/mol) \times V(L)$$

$$m(g) = 0.27 \text{ mol/L} \times 53.5 \text{ g/mol} \times 500 \text{ ml} \times \frac{1L}{1000 \text{ ml}} = 7.22 \text{ g}$$

تزداد درجة تفكك حامض النتروز HNO_2 عند اضافة الماء اليه وتقل عند اضافة نترت الصوديوم $NaNO_2$ ؟


عند اضافة الماء تقل جزيئات المذاب من الايونات في المحلول ولتعويض النقص يتفكك الحامض اي بالاتجاه الامامي حسب قاعدة لوشاتليه ، اما عند اضافة ملحه فيتكون ايون مشترك اي زيادة في ايون النترت NO_2^- لذلك فان التفاعل يتجه بالاتجاه الذي يقلل من ايون النترت اي بالاتجاه الخلفي فيتكون الحامض فتقل درجة التفكك للحامض حسب قاعدة لوشاتليه ايضاً .

المحاليل المنظمة (محاليل بفر)

محلول البفر:

محلول مائي مكون من مزيج لحامض ضعيف مع احد املاحه (القاعدة القرينة للحامض الضعيف) او قاعدة ضعيفة مع احد املاحها (الحامض القرين للقاعدة الضعيفة) ويكون لهذا المزيج القابلية على مقاومة التغير في الاس الهيدروجيني PH عند اضافة كمية صغيرة من حامض قوي او قاعدة قوية اليه .

انواع المحاليل المنظمة :



(2) محلول قاعدة ضعيفة وملحها :

مثال الامونيا وملح كلوريد

أ- اضافة حامض قوي (HCl)

$$POH = PK_b + \log \frac{[salt] + [H^+]}{[base] - [H^+]} \quad \text{القانون :}$$

ب- اضافة قاعدة قوية ($NaOH$) :

$$POH = PK_b + \log \frac{[salt] - [OH^-]}{[base] + [OH^-]} \quad \text{القانون :}$$

(1) محلول حامض ضعيف وملحه :

مثال حامض الخليك وخلات الصوديوم الامونيوم


أ- اضافة حامض قوي (HCl) :

$$PH = PK_a + \log \frac{[salt] - [H^+]}{[acid] + [H^+]} \quad \text{القانون :}$$

ب- اضافة قاعدة قوية ($NaOH$) :

$$PH = PK_a + \log \frac{[salt] + [OH^-]}{[acid] - [OH^-]} \quad \text{القانون :}$$

احسب مقدار التغير الحاصل في قيمة PH بعد اضافة 1 ml من محلول حامض الهيدروكلوريك تركيزه 10 M الى لتر من محلول بفر مكون من حامض الخليك بتركيز 0.1 M وخلات الصوديوم بتركيز 0.1 M ($PK_a = 4.74$) ($\log \frac{9}{11} = -0.087$) .




$$PH = PK_a + \log \frac{[salt]}{[acid]} \Rightarrow PH = 4.74 + \log \frac{0.1}{0.1}$$

$$PH = 4.74$$

(HCl بعد الاضافة) $M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$ (HCl قبل الاضافة)

$$10M \times 1ml \times \frac{1L}{1000ml} = M_2 \times 1L \quad M_2 = 0.01mol/L$$



$$PH = PK_a + \log \frac{[salt] - [H^+]}{[acid] + [H^+]}$$

$$PH = 4.74 + \log \frac{0.10 - 0.01}{0.10 + 0.01}$$


$$PH = 4.74 + \log \frac{0.09}{0.11}$$

$$PH = 4.74 + \log \frac{9}{11}$$

$$PH = 4.74 + (-0.087) = 4.653$$

ما قيمة الاس الهيدروجيني PH لمزيج بفرى مكون من حامض الخليك بتركيز $0.15 M$ و خلاص الصوديوم بتركيز $0.25 M$ ؟ ثم احسب قيمة PH المحلول الناتج بعد اضافة $2g$ من هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ ($M = 40g/mol$) الى لتر من محلول بفرى ، علماً ان $\log 1.8 = 0.26$ ، $\log 3 = 0.477$ ، $\log 5 = 0.7$ ، $K_a(CH_3COOH) = 1.8 \times 10^{-5}$
 $PH_2 = 5.217$ ، $PH_1 = 4.963$

احسب قيمة PH (أ) للتر من محلول بفرى مكون من الامونيا بتركيز $0.1 M$ وكلوريد الامونيوم بتركيز $0.1 M$ ب) لنفس محلول بفرى لكن بعد اضافة $1ml$ من محلول حامض الكبريتيك تركيزه $10 M$ ، ثم احسب مقدار التغير في قيمة PH علماً ان $PK_b = 4.74$ ، $\log 3 = 0.5$ ، $\log 2 = 0.3$



$$POH = PK_b + \log \frac{[salt]}{[base]}$$



$$POH = 4.74 + \log \frac{0.1}{0.1}$$

$$POH = 4.74 + \log 1 = 4.74$$

$$PH + POH = 14 \Rightarrow PH = 14 - 4.74 = 9.26 = PH_1$$

(H_2SO_4 بعد الاضافة) $M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$ (H_2SO_4 قبل الاضافة)

$$10M \times 1ml \times \frac{1L}{1000ml} = M_2 \times 1L \quad M_2 = 0.01mol/L$$



$$POH = PK_b + \log \frac{[salt] + [H^+]}{[base] - [H^+]}$$

$$POH = 4.74 + \log \frac{0.10 + 0.02}{0.10 - 0.02}$$

$$POH = 4.74 + \log \frac{0.12}{0.08}$$

$$POH = 4.74 + \log \frac{3}{2}$$

$$POH = 4.74 + \log 3 - \log 2$$

$$POH = 4.74 + 0.5 - 0.3 = 4.94$$

$$PH + POH = 14 \Rightarrow PH = 14 - 4.94 = 9.06 = PH_2$$

$$\Delta PH = PH_2 - PH_1 = 9.06 - 9.26 = -0.2 : \Delta PH$$

واجب

احسب مقدار التغير لـ PH بعد اضافة $0.05 M$ من محلول $Ba(OH)_2$ الى لتر واحد من محلول بفر مكون من NH_3 $0.1 M$ و NH_4Cl $0.3 M$ علماً أن $K_b NH_3 = 2 \times 10^{-5}$ ، $\log 2 = 0.3$ ، $\log 3 = 0.47$ ،

$$\Delta PH = + 0.47$$

ملاحظات حول الالكتروليت القوي المضاف الى محلول البفر حيث له اربع حالات :

(1) يعطي التركيز المولاري والحجم قبل الاضافة : نجد المولارية له بعد الاضافة من قانون التخفيف .

(2) يعطي له الكتلة والكتلة المولية : نجد المولارية له بعد الاضافة من $M = \frac{m(g)}{M(\frac{g}{mol})} \times \frac{1}{V(L)}$

(3) يعطي له عدد المولات : نجد المولارية له من $M = \frac{n(mol)}{v(L)}$.

(4) يعطي التركيز المولاري للقوي بعد الاضافة : فهنا تستخدم بشكل مباشر .

الذوبانية وثابت الاذابة

انواع الذوبانية :

(1) الذوبانية المولارية $S(mol/l)$:



وهي عدد مولات المادة التي يمكن ان تذوب في لتر واحد من المحلول المشبع عند الاتزان وهي تمثل التركيز المولاري للأيونات الناتجة من تفكك الملح الشحيح الذوبان .

(2) الذوبانية الغرامية (g/l) :

وهي عدد غرامات الملح الشحيح الذوبان والتي يمكن تذوب في لتر واحد من المحلول المشبع .

$$S(mol/L) = \frac{\text{الذوبانية الغرامية } (g/L)}{M(g/mol)}$$

العلاقة بين نوعي الذوبانية هي

$$K_{SP} = S^2$$

$$K_{SP} = 4S^3$$

العلاقة بين K_{SP} والذوبانية المولارية S :

ما هي الذوبانية المولارية لملاح كبريتات الرصاص $PbSO_4$ ؟ اذا علمت ان ثابت حاصل الذوبان لهذا الملح $K_{SP} = 1.6 \times 10^{-8}$ ($\sqrt{1.6} = 1.26$) .

(2016/د1 وكذلك جد الذوبانية بعد اضافة $2ml$ من $10 M$ من ملح Na_2SO_4)



S S

$$K_{SP} = [Pb^{+2}][SO_{4^{-2}}] \Rightarrow K_{SP} = S^2$$

$$1.6 \times 10^{-8} = S^2 \Rightarrow S = \sqrt{1.6 \times 10^{-8}} = 1.26 \times 10^{-4} mol/L$$

مثال 17

حاصل الاذابة QSP:

إذا أعطى في السؤال تراكيز مولارية لأيونات الملح الشحيح ، والمطلوب هل يحصل ترسيب (خلفي) أم ذوبان (امامي) فنجد في هذه الحالة حاصل الاذابة Q_{SP} (وهو يساوي حاصل ضرب التراكيز المولارية للأيونات مرفوعة الى أس يمثل عدد المولات في المعادلة) ثم يقارن مع K_{SP} ، وكالاتي :

- (1) إذا كان $K_{SP} > Q_{SP}$ ، يحصل ذوبان وليس ترسيب أي بالاتجاه الامامي والمحلل غير مشبع
- (2) إذا كان $K_{SP} < Q_{SP}$ ، يحصل ترسيب وليس ذوبان أي بالاتجاه الخلفي والمحلل فوق المشبع
- (3) إذا كان $K_{SP} = Q_{SP}$ ، المحلول مشبع وهو اتزان بين الذوبان والترسيب

محلول من نترات الفضة $AgNO_3$ تركيزه $0.01 M$ وحجمه $20ml$ اضيف الى $80ml$ من محلول $0.05 M$ كرومات البوتاسيوم (K_2CrO_4) بين هل تترسب كرومات الفضة ؟
 علماً ان $K_{SP}(Ag_2CrO_4) = 1.1 \times 10^{-10}$.

أمثلة 21

(1) نجد التراكيز المولارية لكلا المحلولين بعد المزج (M_2) من قانون التخفيف بعد ايجاد الحجم الكلي V_T :

$$V_T = 20ml + 80ml = 100ml$$

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2 \quad \text{- مولارية } AgNO_3 :$$

$$0.01 \times 20ml = M_2 \times 100ml$$


$$M_2 = 0.002mol/L = [Ag^+] \quad (\text{لانه قوي})$$

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2 \quad \text{- مولارية } (K_2CrO_4) :$$

$$0.05 \times 80ml = M_2 \times 100ml$$

$$M_2 = 0.04mol/L = [CrO_4^{2-}] \quad (\text{لانه قوي})$$

(2) نكتب المعادلة ثم نجد حاصل الذوبان Q_{SP} :



$$Q_{SP} = [Ag^+]^2 [CrO_4^{2-}] = (0.002)^2 \times 0.04 = 1.6 \times 10^{-7}$$

(3) نقارن Q_{SP} مع K_{SP} : بما ان $K_{SP} < Q_{SP}$ إذن يحصل ترسيب (خلفي)

العوامل المؤثرة على الذوبانية:

(1) تأثير درجة الحرارة : (2016-د1- ما تأثير ؟)

ان عملية ذوبان أي مادة تصاحبها امتصاص طاقة وذلك للتغلب على قوى الترابط بين مكونات المادة المذابة ، وبصورة عامة تزداد ذوبانية معظم المواد شحيحة الذوبان بزيادة درجة الحرارة ولكن يختلف مقدار هذه الزيادة من مادة الى أخرى .

(2) تأثير الايون المشترك (2015/د2 - الهمية) (2018/د1 - خ.ق - وضع تأثير)

ان وجود الايون المشترك في محلول الملح الشحيح الذوبان يرجح التفاعل العكسي (نحو الترسيب) اي يقلل الذوبانية (حسب قاعدة لوشاتليه) ويستفاد منها في التحكم بعملية ذوبان الرواسب للاملاح الشحيحة .

احسب الذوبانية المولارية (mol/L) والذوبانية بدلالة (g/L) لملاح كبريتات الفضة
 Ag_2SO_4 ($M = 314 g/mol$) و ($PK_{SP} = 4.92$) في (أ) الماء النقي ، (ب) محلول M
 0.15 كبريتات البوتاسيوم K_2SO_4 . $\log 1.2 = 0.08$ ، $\sqrt[3]{3} = 1.4$ ، $\sqrt{20} = 4.4$.

سؤال 19

(أ) الذوبانية في الماء النقي (S) :

$$K_{SP} = 10^{-PK_{SP}} = 10^{-4.92} = 10^{-4.92+5-5}$$

$$K_{SP} = 10^{0.08} \times 10^{-5} = 1.2 \times 10^{-5}$$



$$K_{SP} = [Ag^+]^2[SO_4^{2-}] \Rightarrow 1.2 \times 10^{-5} = (2S)^2(S)$$

$$4S^3 = 1.2 \times 10^{-5} \Rightarrow S^3 = 3 \times 10^{-6}$$


$$S = \sqrt[3]{3 \times 10^{-6}} = 1.4 \times 10^{-2} mol/L$$

$$y(mol/L) \text{ الذوبانية المولارية} = \frac{\text{الذوبانية الغرامية (g/L)}}{M(g/mol)}$$

$$1.4 \times 10^{-2} mol/L = \frac{\text{الذوبانية الغرامية (g/L)}}{314 (g/mol)}$$

$$(g/L) \text{ الغرامية الذوبانية} = 1.4 \times 10^{-2} mol/L \times 314 (g/mol) = 4.396 g/L$$

(ب) نجد الذوبانية في محلول الايون المشترك (y) :



$$2y \quad y$$



$$\text{تراكيز ابتدائية} \quad 0.15 \quad 0 \quad 0$$

$$\text{تراكيز نهائية} \quad 0 \quad 0.3 \quad 0.15$$

$$K_{SP} = [Ag^+]^2[SO_4^{2-}] \quad \text{تهمل}$$

$$1.2 \times 10^{-5} = (2y)^2(y + 0.15) \Rightarrow 4y^2 = \frac{1.2 \times 10^{-5}}{0.15}$$

$$y^2 = 20 \times 10^{-6} \Rightarrow y = 4.4 \times 10^{-3} mol/L$$

$$y(mol/L) \text{ الذوبانية المولارية} = \frac{\text{الذوبانية الغرامية (g/L)}}{M(g/mol)}$$

$$4.4 \times 10^{-3} mol/L = \frac{\text{الذوبانية الغرامية (g/L)}}{314 (g/mol)}$$

$$(g/L) \text{ الذوبانية الغرامية} = 4.4 \times 10^{-3} mol/L \times 314 (g/mol) = 1.38 g/L$$



قيمة ثابت حاصل الاذابة لملاح فلوريد المغنيسيوم MgF_2 تساوي $K_{SP} = 6.5 \times 10^{-9}$ (أ) احسب الذوبانية المولارية لهذا الملح في الماء النقي (ب) احسب الذوبانية المولارية لهذا الملح في محلول فلوريد الصوديوم NaF تركيزه $0.1 mol/L$ ثم قارن بين النتيجتين $\sqrt[3]{1.63} = 1.18$.

امتحان 15

ما ذوبانية $BaSO_4$ في محلول مشبع منه علماً بأن $K_{SP} = 1.6 \times 10^{-10}$ ، وما ذوبانيته بعد اضافة $1ml$ من H_2SO_4 تركيزه $10 M$ الى لتر من المحلول المشبع منه . $\sqrt{1.6} = 1.26$



S S

$$K_{SP} = [Ba^{+2}][SO_4^{-2}] \Rightarrow K_{SP} = S^2$$


$$1.6 \times 10^{-10} = S^2 \Rightarrow S = \sqrt{1.6 \times 10^{-10}} = 1.26 \times 10^{-5} mol/L$$

(H_2SO_4 بعد الاضافة) $M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$ (H_2SO_4 قبل الاضافة)

$$10 M \times M_2 \times 1L \times 1ml \times \frac{1L}{1000ml} = \Rightarrow M_2 = 0.01 mol/L$$



y y



تراكيز ابتدائية 0.01

0

0

تراكيز نهائية 0

0.02

0.01

$$K_{SP} = [Ba^{+2}][SO_4^{-2}] \quad \text{تھمل}$$

$$1.6 \times 10^{-10} = (y)(y + 0.01)$$

$$y = 1.6 \times 10^{-8}$$

(2017د-1) موصل K_{SP} غير معلوم ولكن S معلومة . (2017د-2) y معلومة ، والمطلوب S

واجب

ما ذوبانية ملح كرومات الباريوم $BaCrO_4$ في محلول يكون فيه تركيز كلوريد الباريوم

$BaCl_2$ (الكتروليت قوي) يساوي $0.1 M$ ؟ اذا علمت ان $K_{SP}(BaCrO_4) = 1.2 \times 10^{-10}$

$$\sqrt{1.2} = 1.1 \quad 1.2 \times 10^{-10}$$

(3) تأثير الاس الهيدروجيني : (س/ما تأثير الاس الهيدروجيني على الذوبانية ؟)

عند اضافة حامض (زيادة في تركيز H^+) الى محلول الملح الشحيح فان ذلك يؤدي الى اتحاد ايونات H^+ مع ايونات OH^- الناتجة من الملح فيتكون الماء وتزداد قابلية الذوبان (قاعدة لوشاتلية) والتفاعل امامي، وعند اضافة قاعدة (زيادة في تركيز OH^-) فيترجح التفاعل الخلفي وتقل قابلية الذوبان .

احسب ذوبانية هيدروكسيد الخارصين في محلول ثبتت حامضيته عند : (أ) $PH = 6$ و (ب) $PH = 9$ اذا علمت ان $(K_{SP}(Zn(OH)_2) = 1.2 \times 10^{-17})$ ، ثم ناقش النتائج .


امتحان 24

(ب) $PH = 9$:

$$PH + POH = 14$$

$$POH = 14 - 9 = 5$$

$$[OH^-] = 10^{-POH} = 10^{-5} mol/L$$



S

10^{-5}

$$K_{SP} = [Zn^{+2}][OH^-]^2$$

$$1.2 \times 10^{-17} = S (10^{-5})^2$$


$$S = 1.2 \times 10^{-7} M$$

(أ) $PH = 6$:

$$PH + POH = 14$$

$$POH = 14 - 6 = 8$$

$$[OH^-] = 10^{-POH} = 10^{-8} mol/L$$



S

10^{-8}

$$K_{SP} = [Zn^{+2}][OH^-]^2$$

$$1.2 \times 10^{-17} = S (10^{-8})^2$$

$$S = 0.12 M$$

عدد الأكسدة:

وهو عدد موجب او سالب او صفر يمثل عدد الالكترونات المفقودة او المكتسبة ويكتب فوق رمز العنصر .

الأكسدة:

وهو تغير كيميائي يصحبه فقدان في الالكترونات من ذرة او مجموعة من الذرات ويؤدي الى زيادة في اعداد التاكسد ، **مثال :** $Na^0 \rightarrow Na^+ + e^-$

الاختزال:

وهو عبارة عن تغير كيميائي يصحبه اكتساب ذرة او مجموعة من الذرات للالكترونات ويؤدي الى نقصان في عدد التأكسد ، **مثال :** $Cl_{2(g)}^0 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$

العامل المختزل:

هو المادة التي تتأكسد وتسبب اختزالاً لمادة اخرى ، اي تفقد الالكترونات ويزداد عدد تأكسدها .

العامل المؤكسد:

هو المادة التي تُختزل وتسبب تأكسداً لمادة اخرى ، اي تكتسب الالكترونات ويقل عدد تأكسدها .

تمرين 3

حدد العامل المختزل والعامل المؤكسد للتفاعل التالي : $Mg_{(s)} + Fe_{(aq)}^{2+} \rightarrow Mg_{(aq)}^{2+} + Fe_{(s)}$

**الخلايا الكهروكيميائية**

مكوناتها : (س وزاي : قارن)


(1) الانود : وهو القطب الذي تجري عنده عملية التأكسد والذي يكون مصدراً للالكترونات وهو القطب الموجب .

(2) الكاثود : وهو القطب الذي تجري عنده عملية الاختزال والذي يكتسب الالكترونات وهو القطب السالب .

انواعها : (1) الخلايا الكلفانية او الفولتائية (2) الخلايا الالكتروليتيية .

(1) الخلايا الكلفانية او الفولتائية :


وهي تلك الخلايا التي تتحول فيها الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية من خلال تفاعل كيميائي يجري تلقائياً (اي ΔG سالبة) لتوليد تيار كهربائي مثال خلية دانيال ، وفيها ينتقل التيار الكهربائي من الانود الى الكاثود بسبب فرق الجهد الكهربائي بين القطبين .
(التعريف ممكن ان يكون خواص او مميزات)



خلية دانيال :

وهي خلية فولتائية تعمل على تحويل التفاعل الكيميائي الى تيار كهربائي وتعمل الخلية بصورة تلقائية (ΔG سالبة) وتتكون من قطب الخارصين انوداً وقطب النحاس كاثوداً .

قطب العنصر : وهو ذلك العنصر المغمور في محلول ايوناته و في حالة تماس مع محلول ايوناته .



الجسر الملحي

وهو عبارة عن انبوب زجاجي على شكل حرف U مقلوب يحتوي على محلول الكتروليتي لا يتغير كيميائياً اثناء العملية يُثبت بداخل الانبوب بمادة الاكار (وهي مادة صمغية) ومن المحاليل الالكتروليتية المستعملة لملي الجسر الملحي هي K_2SO_4 ، KNO_3 ، KCl .

اهميته : (1) ايصال الدائرة الكهربائية (2) نقل الايونات السالبة الى الانود والايونات الموجبة الى الكاثود .

جهد الخلية الكلفانية E_{Cell}

هو اكبر قيمة لفرق الجهد الكهربائي بين القطبين في الخلية الكلفانية وهو مقياس للقوة الدافعة الكهربائية الحاصلة في الخلية ويقاس بالفولت (V) .

جهد القطب:

هو فرق الجهد الحاصل بين لوح العنصر ومحلول ايوناته ، وهو على نوعين :

- (1) **جهد التاكسد (E_{Ox})** : مقدار ميل المادة نحو فقدان الالكترونات .
- (2) **جهد الاختزال (E_{Red})** : مقدار ميل المادة نحو اكتساب الالكترونات .

سؤال ماهي الظروف القياسية ؟

درجة الحرارة $25C^{\circ}$ ، الضغط $1 atm$ (في القطب الغازي) ، التراكيز للايونات لمحاليل القطبين $1 M$.

سؤال ماهي العوامل المؤثرة على جهد الخلية ؟

- (1) طبيعة الاقطاب والايونات (2) تراكيز الايونات (3) درجة الحرارة .

قطب الهيدروجين القياسي (SHE) :

(2016 د 2 - خ ق - اهميته)

وهو قطب مرجع ذو جهد قياسي معلوم يستخدم لقياس جهود اقطاب العناصر الاخرى ويتكون من انبوبة زجاجية يضخ فيها غاز الهيدروجين بضغط $1 atm$ وفي حالة تماس مع محلول يحتوي على ايونات (H^{+}) مثل محلول حامض HCl ويكون تركيزه $1 M$ وعند درجة حرارة $25C^{\circ}$.

سؤال

اختيار قطب الهيدروجين القياسي كقطب مرجع ، علل ؟

لانه عنصر نشاطه الكيميائي متوسط بين العناصر فيمكن استخدامه كقطب انود او

سؤال

استخدام عنصر البلاتين Pt في صناعة الاقطاب الغازية علل ذلك ؟

لانه مادة خاملة لا تعاني تأكسداً ولا اختزالاً تحت الظروف التي يستخدم بها .

سؤال

ما هي اهمية البلاتين Pt في صناعة قطب الهيدروجين ؟

- (1) سلك Pt : توفير وسيلة لحدوث توصيل كهربائي مع الدائرة الكهربائية . كاثود .
- (2) قطعة البلاتين الخشنة المغطاة بالبلاتين الاسود : توفير سطح للقطب يمكن تفكك جزيئات الهيدروجين عليه



حساب جهد الخلية القياسي E_{cell}^0 :

- (1) يتم اختيار قطب الانود للعنصر الذي يمتلك اقل جهد اختزال قياسي والكاثود الاعلى جهد .
- (2) يجب ان يكون عدد الالكترونات المفقودة على الانود يساوي عدد الالكترونات المكتسبة على الكاثود .
- (3) عند ضرب طرفي معادلات الاقطاب بعدد معين ، فان قيمة جهد القطب القياسي تبقى ثابتة لا تتغير ، علل ؟
- ج/ وذلك لان الجهد من الخواص المركزة والتي لا تعتمد على كمية المادة المشتركة في التفاعل انما يعتمد على التركيز المولاري للايونات .
- (4) يحسب جهد الخلية القياسي E_{cell}^0 من العلاقة : $E_{cell}^0 = E_{anode}^0 + E_{cathode}^0$.
- (5) اذا كانت قيمة جهد الخلية القياسي موجبة ($E_{cell}^0 = +$) فالتفاعل تلقائي ، اذا كانت سالبة غير تلقائي

تمرين 5

احسب جهد الخلية القياسي لخلية تم عملها من قطب الكاديوم Cd المغمور في محلول 1 M من نترات الكاديوم وقطب الكروم Cr المغمور في محلول 1 M من نترات الكروم . اذا علمت ان جهود الاختزال القياسية : $E_{Cd^{2+}/Cd}^0 = -0.40 V$ و $E_{Cr^{3+}/Cr}^0 = -0.74 V$

نختار قطب الكروم انوداً لان جهد اختزاله الاقل قيمة وقطب الكاديوم كاثوداً لان جهد اختزاله الاكثر قيمة :




$$E_{cell}^0 = E_{anode}^0 + E_{cathode}^0 = 0.74 + (-0.40) = +0.34 V$$

هل يمكن حفظ محلول ملح الطعام في اناء من النحاس علماً ان جهود الاختزال القياسية

$$E_{Na^+/Na}^0 = -2.70 \text{ V} , E_{Cu^{2+}/Cu}^0 = +0.34 \text{ V}$$

غير تلقائي :

يمكن الحفاظ عندما لا يحصل تفاعل بين الاناء والمحلول اي عندما يكون الجهد سالب



$$E_{cell}^0 = E_{anode}^0 + E_{cathode}^0 = -0.34 + (-2.70) = -3.04 \text{ V}$$

∴ يمكن الحفاظ لان الجهد له قيمة سالبة اي التفاعل غير تلقائي .

ملاحظة : الاناء دائماً هو الانود والمحلول هو الكاثود .



هل يمكن حفظ محلول كبريتات النحاس $CuSO_4$ في اناء من النيكل ام لا يمكن ذلك ؟

بين ذلك مع ذكر السبب ؟ علماً ان جهود الاختزال القياسية $E_{Cu^{2+}/Cu}^0 = +0.34 \text{ V}$ و

$$E_{Ni^{2+}/Ni}^0 = -0.24 \text{ V}$$

هل يستطيع الذهب ان يحترق الهيدروجين عند تفاعل الذهب مع الحوامض المخففة ؟

ولماذا ؟ علماً بأن جهد الاختزال القياسي للذهب $E_{Au^{+3}/Au}^0 = 1.50 \text{ V}$.



$$E_{cell}^0 = E_{anode}^0 + E_{cathode}^0 = -1.50 + 0.0 = -1.50 \text{ V}$$

∴ الذهب لا يحترق غاز الهيدروجين لان التفاعل غير تلقائي (قيمة الجهد سالبة) .




أنواع الأقطاب

(1) القطب الفلزي (2) القطب الغازي (3) اقطاب التأكسد والاختزال (القطب الايوني) .

التعبير عن الخلية : اليمين تفاعل الكاثود | | تفاعل الانود اليسار

سؤال




عبر عن الخلية الكلفانية الآتية كتابة عند الظروف القياسية ثم بين تفاعلي التأكسد



هل بإمكان محلول HCl اذابة فلز الفضة الموجود في محلول يحتوي على ايون الفضة Ag^+ بتركيز (1 M) للخلية التالية ، علماً بأن جهد الاختزال القياسي للفضة



ج/ نكتب تفاعلي الانود والكاثود (الانصاف) من التعبير ثم نجد E_{cell}^0 فاذا كانت موجبة فالتفاعل تلقائي ويحصل ذوبان ، واذا كانت سالبة فالتفاعل غير تلقائي ولا يحصل ذوبان



$$E_{cell}^0 = E_{anode}^0 + E_{cathode}^0 = -0.80 + 0.0 = -0.80 V$$

وبما قيمة جهد الخلية سالبة لذا فالتفاعل غير تلقائي ولا يحصل ذوبان ، اي الحامض لا يذيب فلز الفضة .

العلاقة بين جهد الخلية E_{CELL}^0 والطاقة الحرة ΔG^0 وثابت الاتزان K_{eq} :



$$\Delta G^0 = -nFE_{cell}^0$$


$$E_{cell}^0 = \frac{0.026}{n} \ln K_{eq}$$

$$\Delta G^0 = -RT \ln K_{eq}$$

القوانين:

لتفاعل الخلية القياسي التالي عند درجة حرارة $25C^0$: $2Fe_{(aq)}^{3+} + 2I_{(aq)}^- \rightarrow 2Fe_{(aq)}^{+2} + I_{2(s)}$

اذا علمت ان جهود الاختزال القياسية $E_{I_2/I^-}^0 = +0.53V$ و $E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^0 = 0.77V$ احسب : أ (جهد الخلية القياسي ب) طاقة كبس الحرة القياسية ج (ثابت الاتزان



$$E_{cell}^0 = E_{anode}^0 + E_{cathode}^0 = -0.53 + 0.77 = +0.24 V$$

ب (طاقة كبس الحرة القياسية :

$$\Delta G^0 = -nFE_{cell}^0$$

$$\Delta G^0 = -2 \times 96500 \times 0.24$$

$$\Delta G^0 = -46320 J/mol$$

$$E_{cell}^0 = \frac{0.026}{n} \ln K_{eq}$$

$$\ln K_{eq} = 18.46$$

$$\log K_{eq} = 8 \Rightarrow 0.24 = \frac{0.026}{2} \ln K_{eq}$$

$$K_{eq} = 1 \times 10^8 \Rightarrow 2.3 \log K_{eq} = 18.46$$

ج (ثابت الاتزان :

معادلة نيرنست:

معادلة نيرنست:

وهي العلاقة التي تربط جهد الخلية الغير قياسي E_{cell} مع جهدھا القياسي E_{cell}° ، عندما يكون احد او جميع المواد المشاركة ذات تراكيز لا تساوي الواحد الصحيح وفي درجات حرارة مختلفة ، وتكتب بالعلاقة التالية :

احسب E_{cell}° و E_{cell} و ΔG للخلية الاتية : $Mg | Mg^{3+} (0.05 M) || Sn^{2+} (0.04 M) | Sn$ اذا علمت ان جهود الاختزال القياسية : $E_{Sn^{2+}/Sn}^{\circ} = -0.14V$ و $E_{Mg^{2+}/Mg}^{\circ} = -2.37V$ ($\log 1.25 = 0.1$)

سؤال

(1) نجد E_{cell}° : نحدد الانود والكاثود من التعبير عن الخلية (اليسار انود واليمين كاثود) :



$$E_{cell}^{\circ} = E_{anode}^{\circ} + E_{cathode}^{\circ} = 2.37 + (-0.14) = 2.23V$$

$$E_{cell} = E_{cell}^{\circ} - \frac{0.026}{n} \ln \frac{[Mg^{+2}]}{[Sn^{+2}]} \quad (2) \text{ نحسب } E_{cell} \text{ من نيرنست :}$$

$$E_{cell} = 2.23 - \frac{0.026}{2} \ln \frac{0.05}{0.04}$$

$$E_{cell} = 2.23 - 0.013 \ln \frac{5}{4}$$

$$E_{cell} = 2.23 - 0.013 \ln 1.25$$

$$E_{cell} = 2.23 - 0.013 \times 2.3 \log 1.25$$

$$E_{cell} = 2.23 - 0.03 \times 0.1$$

$$E_{cell} = 2.230 - 0.003 = 2.227V$$

$$\Delta G = -nFE_{cell} = -2 \times 96500 \times 2.227 = -429811 J \quad (3) \text{ نجد } \Delta G :$$

احسب التغير في الطاقة الحرة لتفاعل الخلية التالي في درجة $25C^{\circ}$:



الاختزال القياسية $E_{Mg^{2+}/Mg}^{\circ} = -2.37 V$ و $E_{Br_2/Br^{-}}^{\circ} = +1.07V$ اذا علمت ان جهود

واجب



اذا علمت ان جهد الخلية غير القياسي يساوي $(0.17V)$ ، احسب تركيز ايونات النيكل

Ni^{2+} ، علماً ان قطب القصدير في ظروفه القياسية وجهود الاختزال $E_{Sn^{2+}/Sn}^{\circ}$

و $-0.14 V$ و $E_{Ni^{2+}/Ni}^{\circ} = -0.25 V$.

سؤال



$$E_{cell}^{\circ} = E_{anode}^{\circ} + E_{cathode}^{\circ} = +0.25 + (-0.14) = +0.11V$$

$$E_{cell} = E_{cell}^{\circ} - \frac{0.026}{n} \ln \frac{[Ni^{2+}]}{[Sn^{2+}]}$$

$$0.17 = 0.11 - \frac{0.026}{2} \ln \frac{[Ni^{2+}]}{1}$$

$$0.06 = -0.013 \ln[Ni^{2+}]$$

$$\ln[Ni^{2+}] = -\frac{0.060}{0.013}$$




$$\ln[Ni^{2+}] = -4.6$$

$$\therefore \ln 10^{-2} = 4.6 \Rightarrow \therefore \ln[Ni^{2+}] = \ln 10^{-2} \Rightarrow [Ni^{2+}] = 0.01 \text{ M}$$

ما مقدار التغير في الطاقة الحرة للخلية التالية في درجة 25°C علماً أن $K_{eq} = 2.3 \times 10^4$ وان التفاعل العام لهذه الخلية : $2H^+_{(aq)} (1 \text{ M}) + Pb_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} + Pb^{2+}_{(aq)} (0.01 \text{ M})$. ($\log 2.3 = 0.36$)

سؤال

(1) نجد E_{cell}^0 من K_{eq} : الانود



$$E_{cell}^0 = \frac{0.026}{n} \ln K_{eq}$$

$$E_{cell}^0 = \frac{0.026}{2} \ln 2.3 \times 10^4$$

$$E_{cell}^0 = 0.013 \times 2.3 (\log 2.3 + \log 10^4)$$

$$E_{cell}^0 = 0.03(0.36 + 4) = 0.13V$$

$$E_{cell} = E_{cell}^0 - \frac{0.026}{n} \ln \frac{[Pb^{2+}]}{[H^+]^2}$$

$$E_{cell} = 0.13 - \frac{0.026}{2} \ln \frac{0.01}{1}$$

$$E_{cell} = 0.13 - \frac{0.026}{2} \ln 10^{-2}$$

$$E_{cell} = 0.13 + 2 \frac{0.026}{2} \times 2.3$$



$$E_{cell} = 0.1300 + 0.0598 = 0.1898 \text{ V}$$

$$\Delta G = -nFE_{cell} = -2 \times 96500 \times 0.1898 = -36631 \text{ J/mol} \quad \Delta G \text{ نجد (3)}$$

خلية كلفانية في درجة 25°C احد قطبيها هو الهيدروجين وبضغط 1 atm من غاز الهيدروجين والآخر قطب النيكل تركيز ايوناته فيه (0.01 M) ، احسب الاس الهيدروجيني (PH) لمحلول قطب الهيدروجين اذا علمت ان مقدار الطاقة الحرة لتفاعل الخلية -48.25 KJ/mol ، وان جهد اختزال قطب النيكل القياسي -0.25 V ؟

سؤال

(1) الانود هو النيكل لانه الاقل والهيدروجين هو الكاثود لانه الاكبر قيمة لجهد الاختزال :



$$E_{cell}^0 = E_{anode}^0 + E_{cathode}^0 = 0.25 + 0.0 = +0.25V$$

$$\Delta G \text{ J/mol} = -48.25 \text{ KJ/mol} \times \frac{1000 \text{ J}}{1 \text{ KJ}} = -48250 \text{ J/mol} \quad (2)$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{cell}} \quad (3)$$

$$-48250 = -2 \times 96500 \times E_{\text{cell}} \Rightarrow E_{\text{cell}} = 0.25 \text{ V}$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^0 - \frac{0.026}{n} \ln \frac{[Ni^{2+}]}{[H^+]^2} \quad (4)$$

$$0.25 = 0.25 - \frac{0.026}{2} \ln \frac{0.01}{[H^+]^2}$$

$$0 = -0.013 \ln \frac{0.01}{[H^+]^2}$$

$$\ln \frac{0.01}{[H^+]^2} = 0 \quad \therefore \quad \ln 1 = 0$$

$$\therefore \ln \frac{0.01}{[H^+]^2} = \ln 1 \Rightarrow \frac{0.01}{[H^+]^2} = 1$$


$$[H^+]^2 = 0.01 \Rightarrow [H^+] = 0.1 \text{ M}$$

$$PH = -\log[H^+] = -\log 10^{-1} = 1 \quad (5)$$

سؤال

احسب جهد قطب غاز H_2 في $25^\circ C$ وضغط 1 atm اذا علمت ان PH محلوله الالكتروليتي = 1

$$[H^+] = 10^{-PH} = 10^{-1} \text{ M}$$



$$E_{H_2} = E_{H_2}^0 - \frac{0.026}{n} \ln \frac{1}{[H^+]^2} \Rightarrow E_{H_2} = 0 - \frac{0.026}{2} \ln \frac{1}{[10^{-1}]^2}$$

$$E_{H_2} = -0.013 \ln 10^2 = -0.013 \times 2 \times 2.3 = -0.0598 \text{ V}$$

واجب

خلية كلفانية تفاعلها العام في درجة $25^\circ C$ ، وجهدا القياسي يساوي $(+0.74 \text{ V})$ ،

احسب التغير في الطاقة الحرة : $Cu_{(aq)}^{2+}(0.01 \text{ M}) + Cd_{(s)} \longrightarrow Cu_{(s)} + Cd_{(aq)}^{2+}(0.1 \text{ M})$

الخلايا الكهروكيميائية:

وهي الخلايا المستهلكة للتيار الكهربائي وفيها تتحول الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية وتكون تفاعلاتها غير تلقائي ($\Delta G = +$) . (او خواصها وصفاتها)
انواعها : 1) خلايا التحليل الكهربائي 2) خلايا الطلاء الكهربائي .
استخداماتها : في الصناعة وتنقية الفلزات وفي الطلاء الكهربائي .

سؤال

ما الفرق بين الخلية الكلفانية (مثل خلية دانيال) وخلايا التحليل الكهربائي ؟

No	الخلية الكلفانية	خلية التحليل الكهربائي
1	تستخدم التفاعل الكيميائي للحصول طاقة كهربائية	تستخدم الطاقة الكهربائية لحدوث التفاعل الكيميائي
2	تكون تلقائية التفاعل اي ΔG سالبة (-)	تكون غير تلقائية التفاعل اي ΔG موجبة (+)

3	تكون منتجة للتيار الكهربائي	تكون مستهلكة للتيار الكهربائي
4	تنتقل الالكترونات المتحررة عبر السلك الخارجي بينما تنتقل الايونات عبر الجسر الملحي	تنتقل الالكترونات من مصدر الجهد الخارجي (البطارية) بواسطة الايونات الموجودة في المحلول الالكتروني او المواد المنصهرة
5	يكون الانود على اليسار والكاثود على اليمين	يكون الانود على اليمين والكاثود على اليسار
6	مثال خلية دانيال	مثال : خلايا الطلاء الكهربائي و خلية تحليل (NaCl) و H_2O

(1) خلايا التحليل الكهربائي :

وهي الخلايا التي فيها استخدام الطاقة الكهربائية لجعل تفاعل الخلية الالكتروليتي غير التلقائي يحدث ، ويتم فيها تحليل المركب الى عناصره الاولى مثال خلية التحليل الكهربائي لمنصهر كلوريد الصوديوم و خلية التحليل الكهربائي للماء الى عناصره الاولى .

(2) خلايا الطلاء الكهربائي :

الطلاء الكهربائي هو عملية يستخدم فيها التحليل الكهربائي لطلاء فلز معين بطبقة رقيقة من فلز اخر .
اهميته : (1) حماية المعادن من الصدأ والتآكل . (2) اكتساب المعادن مظهر مرغوب وجميل .

مكونات خلية الطلاء :

- (1) **الانود :** يتكون من النقي المراد الطلاء به مثال فلز الذهب Au وفلز الفضة Ag .
- (2) **الكاثود :** يتكون من المادة او السطح المراد طلاؤه مثال ملعقة طعام او خاتم .
- (3) **محلول الخلية :** يكون حاوياً على احد املاح الفلز المراد الطلاء به ، مثال محلول نترات الذهب $Au(NO_3)_3$ عندما يكون الذهب انودا .

شروط الطلاء الجيد :

- (1) **شدة التيار الكهربائي المستخدم يجب ان تكون ضعيفة (2) تركيز ايونات الفلز المراد الطلاء به تكون قليلة .**

قانون فاراداي الاول :

تناسب كتلة اي مادة تترسب على الكاثود او تذوب من الانود او تتحرر كغازات عند هذه الاقطاب مع كمية الكهرباء التي تمر خلال الخلية الكهربائية تناسباً طردياً .

قانون فاراداي الثاني :

تناسب كتل المواد المختلفة التي تترسب على الكاثود او تذوب من الانود او تتحرر كغازات عند هذه الاقطاب ، باستخدام نفس الكمية من الكهرباء مع الكتل المكافئة للمواد المختلفة تناسباً طردياً



القانون	الملاحظات
1) $Q(mol.e^-) = \frac{I(A) \times t(S)}{96500(C/mol.e^-)}$	Q كمية الكهرباء بـ $(mol.e^-)$
2) $Q(mol.e^-) = n(mol) \times n^{e^-}$	n - عدد المولات الفلز المترسبة او الغاز المتحررة n^{e^-} / عدد الالكترونات من معادلة نصف الخلية
3) $Q(mol.e^-) = \frac{\text{عدد } e^- \text{ المارة}}{N_A \text{ عدد افوغادرو}}$	$N_A = 6.023 \times 10^{23}$
4) $n(mol) = \frac{m(g)}{M(g/mol)}$	n - عدد المولات المترسبة من الفلز على الكاثود
5) $n(mol) = \frac{\text{عدد الذرات المترسبة}}{N_A \text{ عدد افوغادرو}}$	n - عدد المولات المترسبة من الفلز على الكاثود
6) $n(mol) = M(mol/L) \times V(L)$	
7) $n_{\text{المترسبة}} = n_{\text{الكلية}} - n_{\text{المتبقية}}$	
8) $n(mol) = \frac{V(L) \times 1(mol)}{22.4(L)}$	للغازات في الظروف القياسية فقط اي في (STP)
9) $n(mol) = \frac{PV}{RT}$	تخص الغازات في الظروف غير القياسية
10) $n(mol) = \frac{\text{عدد الجزيئات المتحررة}}{N_A \text{ عدد افوغادرو}}$	تخص الغازات

سؤال




امرر تيار كهربائي شدته 10A خلال 965 S في خلية تحليل كهربائي تحتوي على كبريتات النحاس ما هو وزن النحاس المترسب وعدد ذراته علماً ان الكتلة الذرية للنحاس = 63 ؟

$$Q(mol.e^-) = \frac{I(A) \times t(S)}{96500(C/mol.e^-)}$$

(1) نجد $Q(mol.e^-)$:

$$Q(mol.e^-) = \frac{10 \times 965}{96500(C/mol.e^-)} = 0.1 mol.e^-$$



(2) نجد عدد مولات النحاس المترسبة :

$$Q(mol.e^-) = n(mol) \times n^{e^-}$$

$$0.1 mol.e^- = n(mol) \times 2e^-$$

$$n(mol) = 0.05 mol$$

$$n(mol) = \frac{m(g)}{M(g/mol)}$$

$$0.05 mol = \frac{m(g)}{63(g/mol)}$$

$\Rightarrow$

$$m(g) = 3.15g$$

(3) نجد وزن النحاس المترسب :

$$n(\text{mol}) = \frac{\text{عدد الذرات المترسبة}}{\text{عدد افوغادرو } N_A}$$

(4) نجد عدد ذرات النحاس المترسبة :

$$0.05 \text{ mol} = \frac{\text{عدد الذرات المترسبة}}{6.023 \times 10^{23}}$$

$$\text{عدد الذرات المترسبة} = 3 \times 10^{22} \text{ atoms}$$

ما هي شدة التيار الذي يجب امراره في محلول كلوريد الذهب $AuCl_3$ واجب

لمدة 200 S ليرسب 3g من الذهب عند الكاثود ، الكتلة الذرية للذهب 197 .

محلول من كبريتات النحاس $CuSO_4$ تركيزه 0.2 M وحجمه 600ml ، امرر تيار كهربائي

شدته 96.5A احسب الزمن اللازم لكي يتبقى 0.03 mol من ايون النحاس .

نجد عدد المولات الكلية من التركيز والحجم ثم عدد المولات المترسبة ثم نجد

$Q(\text{mol. } e^-)$ ثم الزمن :

$$n(\text{mol}) = M(\text{mol/L}) \times V(L)$$


(1) نجد عدد المولات الكلية للنحاس :

$$n(\text{mol}) = 0.2 \text{ mol/L} \times 600 \text{ ml} \times \frac{1L}{1000 \text{ ml}} = 0.12 \text{ mol}$$

$$n(\text{mol})_{\text{المترسبة}} = n(\text{mol})_{\text{الكلية}} - n(\text{mol})_{\text{المتبقية}}$$

(2) نجد عدد المولات المترسبة :

$$n(\text{mol})_{\text{المترسبة}} = 0.12 \text{ mol} - 0.03 \text{ mol} = 0.09 \text{ mol}$$



(3) نجد $Q(\text{mol. } e^-)$:

$$Q(\text{mol. } e^-) = n(\text{mol}) \times n^{e^-} = 0.09 \text{ mol} \times 2e^- = 0.18 \text{ mol. } e^-$$

$$Q(\text{mol. } e^-) = \frac{I(A) \times t(S)}{96500(C/\text{mol. } e^-)}$$

(4) نجد الزمن $t(S)$ من $Q(\text{mol. } e^-)$:

$$0.18 \text{ mol. } e^- = \frac{96.5A \times t(S)}{96500(C/\text{mol. } e^-)} \Rightarrow t(S) = 180 S$$

سؤال 10

احد التفاعلات النصفية للتحليل الكهربائي للماء هو :



وضغط 755 mm.Hg . فأحسب عدد مولات الالكترونات التي يجب تمريرها في المحلول .

نجد عدد مولات O_2 المتحررة ومنها نجد $Q(\text{mol. } e^-)$:

(1) نحول الضغط الى وحدة atm :

$$P(\text{atm}) = 755 \text{ mm.Hg} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ mm.Hg}} = 0.99 \text{ atm}$$

$$T(K) = t(C^\circ) + 273 = 25 + 273 = 298K$$

(2) نجد $T(K)$:

$$PV = nRT$$

(3) نجد عدد مولات O_2 المتحررة :

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.99 \times 0.08}{0.082 \times 298} = 0.003 \text{ mol}$$

$$Q(\text{mol. } e^-) = n(\text{mol}) \times n^{e^-}$$

(4) نجد $Q(\text{mol. } e^-)$:

$$Q(\text{mol. } e^-) = 0.003 \text{ mol} \times 4e^-$$


$$Q(\text{mol. } e^-) = 0.012 \text{ mol. } e^-$$

احسب عدد الالكترونات اللازمة لتحرير ضعف الحجم المولي لغاز الاوكسجين في STP (معلومة : الحجم المولي لاي غاز عند STP يساوي 22.4L) ؟ (2019 - ت/ نصف الحجم المولي)

(1) نحسب عدد مولات غاز O_2 المتحرر :

$$n(mol) = \frac{V(L) \times 1(mol)}{22.4(L)}$$

$$n(mol) = \frac{2 \times 22.4(L) \times 1(mol)}{22.4(L)} = 2mol$$



(2) نحسب $Q(mol.e^{-})$:

$$Q(mol.e^{-}) = n(mol) \times n^{e^{-}}$$

$$Q(mol.e^{-}) = 2mol \times 4e^{-} = 8mol.e^{-}$$

$$Q(mol.e^{-}) = \frac{\text{عدد } e^{-} \text{ المارة}}{N_A \text{ عدد افوغادرو}}$$

(3) نحسب عدد e^{-} المارة :

$$8mol.e^{-} = \frac{\text{عدد } e^{-} \text{ المارة}}{6.023 \times 10^{23}}$$


$$\text{عدد } e^{-} \text{ المارة} = 8mol.e^{-} \times 6.023 \times 10^{23} \frac{electron}{mol.e^{-}}$$

$$\text{عدد } e^{-} \text{ المارة} = 48.18 \times 10^{23} electron$$

سؤال 34

احسب شدة التيار اللازم امراره لمدة 2hr و 520 S في خلية تحليل الماء كهربائياً لكي يحرر 36.12×10^{21} جزيئة من الهيدروجين والاكسجين على قطبي الخلية ؟

نجد شدة التيار من $Q(mol.e^{-})$ بعد ايجادها من عدد جزيئات احد الغازات المتحررة (O_2 او H_2) وكتابة المعادلة :



(1) كتابة معادلة تحليل الماء الى عناصره :

(2) الفرضية :

لان عدد جزيئات غاز H_2 ضعف عدد

جزيئات غاز O_2 كما في المعادلة

نفرض عدد جزيئات غاز $O_2 = x$

نفرض عدد جزيئات غاز $H_2 = 2x$

(3) نجد عدد جزيئات كل غاز : 36.12×10^{21} = عدد جزيئات غاز H_2 و O_2

$$x + 2x = 36.12 \times 10^{21}$$

$$3x = 36.12 \times 10^{21}$$

$$x = 12.04 \times 10^{21} \text{ (عدد جزيئات غاز } O_2 \text{ المتحررة)}$$


$$2x = 2(12.04 \times 10^{21}) \text{ (عدد جزيئات غاز } H_2 \text{ المتحررة)}$$

$$2x = 24.08 \times 10^{21}$$


(4) نجد عدد مولات غاز O_2 المتحررة (او مولات H_2) : $n(mol) = \frac{\text{عدد الجزيئات المتحررة}}{N_A \text{ عدد افوغادرو}}$

$$n(mol) = \frac{12.04 \times 10^{21}}{6.023 \times 10^{23}}$$

$$n(mol) = 0.02 mol$$



(5) نجد $Q(mol.e^-)$: الانود
الكاثود



التفاعل العام

$$Q(mol.e^-) = n(mol) \times n^{e^-}$$

$$Q(mol.e^-) = 0.02mol \times 4e^-$$

$$Q(mol.e^-) = 0.08 mol.e^-$$

(6) نجد الزمن الكلي ب(S):

$$t(S) = 2 hr \times \frac{3600(S)}{1(hr)} + 520 S = 3600 S$$

$$t(S) = 7200S + 520 S = 7720 S$$




(7) نجد التيار:

$$Q(mol.e^-) = \frac{I(A) \times t(S)}{96500(C/mol.e^-)}$$

$$0.08 mol.e^- = \frac{I(A) \times 7720(S)}{96500(C/mol.e^-)} \Rightarrow I(A) = 1 A$$

سؤال

في خلية تحليل الماء كهربائياً في STP يمرر تيار كهربائي فيها لمدة 3 دقائق و 13 ثانية فتحرر غازي الهيدروجين والأكسجين عند قطبي الخلية وكان مجموع حجمي الغازين المتحررين يساوي 0.0672 L ، اكتب معادلتني نصفي الخلية والتفاعل العام لها ثم جد حجم كل غاز متحرر وشدة التيار المار



(1) كتابة المعادلات: الانود

الكاثود

التفاعل العام

(2) ايجاد حجم غاز H_2 و O_2 : نفرض حجم غاز $O_2 = x$ ونفرض حجم غاز $H_2 = 2x$ (لان حجم غاز H_2 المتحرر ضعف حجم غاز O_2 كما في المعادلة)

$$\text{الحجم الكلي} = 0.0672 L$$

$$V_{O_2} + V_{H_2} = 0.0672 L$$

$$x + 2x = 0.0672 L$$

$$3x = 0.0672 L \Rightarrow x = 0.0224 L$$

$$\therefore V_{O_2} = 0.0224 L \quad \therefore V_{H_2} = 0.0448 L$$

$$n(mol) = \frac{V(L) \times 1(mol)}{22.4 (L)} = \frac{0.0224 L \times 1(mol)}{22.4 (L)} = 0.001mol \quad (3) \text{ نجد مولات } O_2 \text{ المتحررة:}$$

(4) نجد $Q(mol.e^-)$:

$$Q(mol.e^-) = n(mol) \times n^{e^-} = 0.001 mol \times 4e^- = 0.004 mol.e^-$$

$$t(S) = 3 min \times \frac{60 S}{1 min} + 13 S = 13 S + 180 S = 193 S \quad (5) \text{ نجد التيار } I(A):$$

$$Q(\text{mol. } e^-) = \frac{I(A) \times t(S)}{96500(C/\text{mol. } e^-)} \Rightarrow 0.004 \text{ mol. } e^- = \frac{I(A) \times 193 S}{96500(C/\text{mol. } e^-)} \quad I(A) = 1 A$$

البطاريات (الانزائد) وخلايا الوقود



وهي على نوعين من حيث اعادة الشحن :

(1) بطاريات اولية : لا يمكن اعادة شحنها مثال الخلية الجافة .

(2) بطاريات ثانوية : يمكن اعادة شحنها مثال بطارية الخزن الرصاصية .

(1) بطارية الخزن الرصاصية :

وهي البطارية التي تتكون من مجموعة خلايا رصاصية كلفانية (ثلاث او ست خلايا) تربط على التوالي جهد كل منها اكثر بقليل من 2V .

مكوناتها : (1) الانود : يتكون من الرصاص (Pb) . (2) الكاثود : يتكون من اوكسيد الرصاص PbO_2

(3) محلول الخلية : وهو محلول الكتروليتي يتكون من حامض الكبريتيك H_2SO_4 المركز ، يغمر فيه القطبين وله كثافة تتراوح من 1.2 g/ml الى 1.3 g/ml عند بداية شحن البطارية .

عملها : عند استمرار عمل الخلية تترسب كبريتات الرصاص بشكل مسحوق ابيض على القطبين ويستهلك حامض الكبريتيك الموجود بشكل متأين فتزداد كمية الماء مما يؤدي الى انخفاض كثافة محلول الحامض .

كيف يمكن اعادة شحن البطارية ؟

سؤال



(1) عندما تنطلق السيارة فأن تفاعلات نصف الخلية سوف تنعكس بسبب الفولتية التي ينتجها المولد (الداينمو) ويعاد انتاج H_2SO_4 و PbO_2 و Pb .

(2) امرار تيار كهربائي خارجي (اعادة شحن) لعكس تفاعل الخلية فتصبح البطارية مجموعة خلايا الكتروليتية حيث يتفكك راسب $PbSO_4$ من على القطبين ويستعيد الحامض تركيزه (كثافته) .

مواصفاتها :

- (1) تستعمل في تشغيل السيارة وكثيرا من المعدات الكهربائية والصناعية (اهميتها) .
- (2) جهدها 6V او 12V (3) قابلة للشحن .

(2) الخلية الجافة (خارصين - كاربون) :

وهي خلية كلفانية تتكون من وعاء من الخارصين يعمل كأنود مملوء بمعجون رطب من MnO_2 و كاربون (كرافيت) وكلوريد الامونيوم NH_4Cl وحيث MnO_2 هو الكاثود .

مواصفاتها :

- (1) تعطي جهد مقداره 1.48V (2) غير قابلة للشحن (3) تستخدم في اجهزة الراديو والحاسوب .

الفصل الخامس - الكيمياء التناسقية

العنصر الانتقالي:

وهو العنصر الذي يكون فيه الغلاف الثانوي d او f مملوء جزئياً اما في حالته الحرة او احد مركباته .

اقسام العناصر الانتقالية :

- (1) عناصر مجموعة d او العناصر الانتقالية الرئيسية :
وتتألف من ثلاث دورات كل منها يحتوي على عشرة عناصر .
- (2) عناصر مجموعة f او العناصر الانتقالية الداخلية :
وتتألف من دورتين كل منها يحتوي على اربعة عشر عنصر .

مميزاتها :

- (1) لها حالات اكسدة متعددة ، اي للعنصر الواحد اكثر من حالة اكسدة .
- (2) تمتاز مركباتها بالصفات البارامغناطيسية وذلك لوجود إلكترونات منفردة في الاغلفة d او f .
- (3) العديد من مركباتها ملونة .
- (4) لها ميل كبير لتكوين ايونات او مركبات معقدة .

الملح المزدوج والمركب التناسقي:

الملح المزدوج :

وهو مركب اضافة مستقر يعطي عند اذابته في الماء كافة الايونات المكونة له بحيث يحتفظ كل ايون بصفاته المستقلة مثال ملح مور $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$.



تحضيره :

المركب التناسقي :

هو مركب اضافة مستقر لكنه لا يعطي كافة الايونات المكونة له عند ذوبانه في الماء ، اي ان الصفات المستقلة تختفي لبعض الايونات مثال $[Cu(NH_3)_4]SO_4$.




تحضيره :

مثال 1

وضح لماذا يصنف المركب $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ كملاح مزدوج بينما يصنف المركب $K_3[Fe(CN)_6]$ كمركب معقد (مركب تناسقي) ؟

- (1) وذلك لان المركب ملح مور وعند ذوبانه في الماء فإنه يعطي كافة ايوناته Fe^{2+} و NH_4^+ و SO_4^{2-}



ويتم التأكد من وجودها في المحلول باستخدام طرائق الكشف الشائعة لكل ايون منها
ولذلك يصنف المركب كملح مزدوج .

(2) اما عند اذابة المركب $K_3[Fe(CN)_6]$ في الماء :



فإنه يعطي كشفاً لايون K^+ فقط واختفاء ايونات Fe^{3+} و CN^- اي لا يعطي كشفاً
لهما لذلك يصنف كمركب تناسقي .

سؤال 1

ما هو الفرق بين الاملاح المزدوجة والمركبات المعقدة ؟

المركبات المعقدة

- المركب المعقد هو مركب اضافة مستقر
لكنه لا يعطي كافة الايونات المكونة له
عند اذابته في الماء
- تختفي صفات بعض الايونات اي لا
تعطي كشفاً لها .
- مثال كبريتات رباعي امين النحاس
 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$


الاملاح المزدوجة

الملح المزدوج هو مركب اضافة
مستقر يعطي كافة الايونات المكونة
له عند اذابته في الماء
يحتفظ كل ايون بصفاته المستقلة ،
ويمكن الكشف عنها .

مثال ملح مور $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$

سؤال

ما هو العدد التأكسدي (التكافؤ الاولي) للحديد في المركبات الآتية :



سؤال

ما التكافؤ الاولي والتكافؤ الثانوي للكروم في $[Cr(NH_3)_6](NO_3)_3$



∴ التكافؤ الاولي = +3 ، التكافؤ الثانوي (عدد التناسق) = 6 .

نظور الكيمياء التناسقية

(1) نظرية السلسلة :

وهي النظرية التي تفسر تكوين المركبات التناسقية بأفترض ان الليكندات ترتبط مع بعضها على شكل سلسلة على غرار تكوين السلاسل بين ذرات الكربون الذي كان معروفاً في في الكيمياء العضوية وترتبط مع الايون المركزي لاشباع نوع واحد من التكافؤ ، وهي النظرية التي اقترحت من قبل احد العلماء في السويد .



وذلك لانها لم تنجح في تفسير كافة الخواص للمركبات حيث انها لم تستطيع تفسير سبب عدم ترسب ايون الكلوريد في المركب $CoCl_3 \cdot 3NH_3$ اضافة الى انها اعتمدت على نوع واحد من التكافؤ .

(2) نظرية فرنر التناسقية :



وهي النظرية التي تفسر تكون المركبات التناسقية بافتراض ان اكثر العناصر تمتلك نوعين من التكافؤ ، تكافؤ اولي يعرف بحالة التأكسد وتكافؤ ثانوي يعرف بعدد التناسق . ويحاول كل عنصر عند اشتراكه في تكوين مركب تناسقي اشباع كلا التكافؤين حيث تتشبع التكافؤات الاولى بأيونات سالبة اما التكافؤات الثانوية فتتشبع بأيونات سالبة او جزيئات متعادلة .

مصطلحات الكيمياء التناسقية

1 () الليكند:

جزء او ايون سالب او موجب الشحنة يرتبط بالايون المركزي من خلال ذرة مانحة واحدة او اكثر للمزدوجات الالكترونية وعندما يهب الليكند مزدوجاً واحداً من الالكترونات يسمى احادي المخلب وعندما يهب مزدوجين من الالكترونات يسمى ثنائي المخلب وعندما يهب اكثر من مزدوجين يسمى متعدد المخلب ، وهومن قواعد لويس .

2 () الايون المركزي:

وهو عبارة عن ذرة مركزية مستقبلية للمزدوجات الالكترونية ، وتكون عادة فلزاً انتقالياً يحتوي على اوربيتالات فارغة ويرتبط مع الليكندات بأصرة تناسقية وهو من حوامض لويس .

3 () المعقد التناسقي:

وهو المركب الناتج من اتحاد الايون المركزي مع عدد من الليكندات بواسطة اصرة تناسقية .

4 () عدد التناسق:

وهو عدد الليكندات التي ترتبط بالايون المركزي مضروباً في عدد المخالب اي انه يساوي عدد الاواصر التناسقية ، واكثر اعداد التناسق شيوعاً 4 و 6 ، اما اعداد التناسق الفردية و 2 فهي نادرة .

5 () الايون المعقد:

وهو صنف مشحون بشحنة موجبة او سالبة يحتوي على ذرة فلز مركزية تحيط بها عدد من الليكندات ، وقد تكون الذرة المركزية متعادلة او لها عدد تأكسد موجب ، اما الليكندات فقد تكون جزيئات متعادلة او ايونات سالبة مثال : $[Co(NH_3)_6]^{3+}$.

6 () المعقد المتعادل:

وهو المعقد الذي لا يحمل شحنة (تساوي 0) ولايتأين في الماء مثال $[Co(NH_3)_3Cl_3]$

7 - مجال التناسق:

وهو المجال الذي يعبر عنه بشكل اقواس مربعة [] والذي يحتوي على الذرة المركزية ومجموعة من الليكنات ويسمى أيضاً بالمجال الداخلي ومكوناته لا تتأين ولا يمكن ترسيبها كما في أيون الكلوريد الداخلي $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$.

8 - مجال التأين:

وهو المجال الذي يكتب خارج المجال التناسقي (خارج الاقواس) ويسمى بالمجال الخارجي ، ولمكوناته القابلية على التأين وبالتالي بالامكان ترسيبها بأحد كواشف الترسيب المناسبة ، حيث يترسب أيوني الكلور كما في $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$.

أنواع الليكنات

1 - ليكنات احادية المخلب (احادية السن) :

وهي عبارة عن ايونات سالبة او جزيئات متعادلة قادرة على منح مزدوج الكتروني واحد الى ايون الفلز الموجب ، اي انها تحوي في تركيبها الكيميائي على ذرة واحدة قابلة للارتباط مع الذرة المركزية للفلز .

ليكنات متعادلة			ليكنات سالبة		
no	صيغة الليكن	اسم الليكن	no	صيغة الليكن	اسم الليكن
1	NH_3	امين	1	SCN^-	ثايوسياناتو
2	H_2O	اكوا	2	N_3^-	ازيدو
3	CO	كاربونيل	3	Br^-	برومو
4	CH_2CH_2	اثيلين	4	Cl^-	كلورو
5	$(NH_2)_2CO$	يوريا	5	CN^-	سيانو
6	NO	نايتروسيل	6	NO_2^-	نايترو
			7	I^-	يودو

2 - ليكنات ثنائية المخلب:

وهي عبارة عن ايونات سالبة او جزيئات متعادلة قادرة على منح مزدوجين الكترونيين ايون الفلز الموجب ، اي لها القدرة على الارتباط بأيون الفلز عبر اكثر من ذرة واحدة مكونة مركبات حلقيه ، وتسمى ايضاً ليكنات ثنائية السن .

no	صيغة الليكن	اسم الليكن
1	NH_2NH_2	هيدرازين
2	dmg^-	ثنائي مثيل كلاديوكسيماتو
3	$C_2O_4^{2-}$	اوكزاليتو (Ox)
4	$NH_2CH_2CH_2NH_2$	اثيلين ثنائي امين (en)

3 - ليكنات متعددة المخلب:

وهي الليكنات التي تحوي في تركيبها الكيميائي اكثر من ذرتين لها القابلية على الارتباط مع الايون المركزي بأواصر تناسقية اي انها تهب ثلاث مزدوجات او اربع او اكثر من ذلك ، مثال اثيلين ثنائي امين رباعي حامض الخليك (EDTA) ، وهو ليكن سداسي المخلب او سداسي السن .

3 - الليكنات الكابتة:

وهي الليكنات التي ترتبط في موقعين أو أكثر في ان واحد مع نفس الايون المركزي (اي لها أكثر من ذرة مانحة) وتشمل الليكنات ثنائية المخلب ومتعددة المخلب .

الذرة المانحة:

وهي احد ذرات الليكند تمتلك مزدوج الكتروني وتستطيع ان تمنحه لذرة الايون المركزي ، وعدد الذرات المانحة يعتمد على نوع الليكند ، فالليكند احادي المخلب يحوي ذرة مانحة واحدة والثنائي المخلب يحوي ذرتين مانحة وهكذا .

قاعدة الذري الفعال: (EAN)

المعقد التناسقي يصبح مستقراً اذا كان مجموع الالكترونات الموجودة على الفلز والالكترونات الممنوحة من قبل الليكنات تساوي العدد الذري لاحد الغازات النبيلة وهي (86 Rn or 54 Xe or 36 Kr) .

العدد الذري الفعال:

وهو المجموع الكلي للالكترونات على الذرة المركزية والممنوحة من الليكنات .

مثال 1

احسب العدد الذري الفعال للمركبات التالية ، ثم بين هل تنطبق عليه قاعدة (EAN) لكل من $[Fe(CN)_6]^{3-}$ ، $[Pd(NH_3)_6]^{4+}$ ، $[Ni(en)_3]^{2+}$ ، $Fe = 26$ ، $Pd = 46$ ، $Ni = 28$

$$\begin{aligned} Fe &= 26e^- & [Fe(CN)_6]^{3-} \\ Fe^{3+} &= 23e^- & (X + (-1 \times 6) = -3 \Rightarrow X - 6 = -3 \Rightarrow X = +3) \\ 6:CN^- &= 12e^- \\ [Fe(CN)_6]^{3-} &= 35e^- \end{aligned}$$

العدد الذري الفعال هنا يساوي 35 وهو لا يساوي العدد الذري لاي من الغازات النبيلة ، ولهذا فلا تنطبق عليه قاعدة (EAN) .

$$\begin{aligned} Pd &= 46e^- & [Pd(NH_3)_6]^{4+} \\ Pd^{4+} &= 42e^- & X + (0 \times 6) = +4 \Rightarrow X + 0 = +4 \Rightarrow X = +4 \\ 6:NH_3 &= 12e^- \\ [Pd(NH_3)_6]^{4+} &= 54e^- \end{aligned}$$

العدد الذري الفعال هنا يساوي 54 وهو يساوي العدد الذري لغاز الزينون ، وتنطبق عليه القاعدة .

$$\begin{aligned} Ni &= 28e^- & [Ni(en)_3]^{2+} \\ Ni^{2+} &= 26e^- & X + (0 \times 3) = +2 \Rightarrow X + 0 = +2 \Rightarrow X = +2 \\ 3:en &= 12e^- \\ [Ni(en)_3]^{2+} &= 38e^- \end{aligned}$$

العدد الذري الفعال هنا يساوي 38 وهو لا يساوي العدد الذري لاي من الغازات النبيلة ، ولهذا فلا تنطبق عليه قاعدة (EAN) .

$$Ag = 47$$



واجب



مركبات الكربونيل :



وهي معقدات تناسقية (متعادلة غالباً) التي يكون فيها الليكند هو الكربونيل (CO)
واغلب مركباتها تخضع لقاعدة (EAN) .



$$Fe = 26e^-$$

$$5CO = 10e^-$$

$$[Fe(CO)_5] = 36e^- \quad \text{تنطبق عليه قاعدة (EAN)}$$

سؤال




تتواجد معقدات الكربونيل ذات الاعدد الذرية الفردية للفلز المركزي بشكل مزدوجات
جزيئية او متعددة جزيئية ، علل ذلك ؟

وذلك لان العدد الذري الفعال لها لا يكون زوجياً الا عندما تكون بشكل مزدوجات او متعددة
جزيئية .

مثال



احسب العدد الذري الفعال للمعقد $[Co_2(CO)_8]$ ثم بين هل تنطبق قاعدة (EAN) عليه
؟ $Co = 27$



$$Co = 27e^-$$

$$Co - Co = 1e^-$$

$$4CO = 8e^-$$

$$[Co_2(CO)_8] = 36e^- \quad \text{اذن تنطبق قاعدة (EAN)}$$

أسماء المركبات التناسقية

(تتم التسمية وفق نظام IUPAC وحسب القواعد الاتية) :

- 1) تحديد الايون السالب (على اليمين) والايون الموجب (على اليسار) .
- 2) نحدد شحنة الايون البسيط ومنها شحنة الايون المعقد بعكس الاشارة .
- 3) نسمي الايون السالب اولاً ثم الايون الموجب .
- 4) اذا كان الايون السالب بسيطاً فنذكر اسم الايون كما هو مثال Cl^- كلوريد ، NO_3^- نترات وبدون ذكر عدد الايونات (والايون البسيط هو الذي يكون خارج الاقواس []) .

(5) نسمي الايون الموجب المعقد بتسمية الليكنندات اولاً ثم الذرة المركزية .

(6) تسمى الليكنندات كالآتي :

(أ) عند وجود اكثر من نوع من الليكنندات فإنها تذكر في التسمية حسب الترتيب الابدجي للحروف الانكليزية (a, b, c,, z) مثال H_2O (Aqua) ثم Br^- ثم Cl^- (عدا الماء قبل الجميع) ، وهكذا ولكن التسمية باللغة العربية .

(ب) تسمى الليكنندات بالطريقة التالية :

(1) الليكنندات المتعادلة : تسمى كما هي مثال CO كاربونيل و CH_3NH_2 مثيل امين وغيرها عدا H_2O (اكو) ، NH_3 امين ، NO نايتروسيل .

(2) الليكنندات السالبة : يضاف لها الحرف (و) كما في Br^- برومو ، CN^- سيانو .

(ج) عند وجود اكثر من ليكند من نفس النوع فيذكر كالآتي :

(1) الليكنندات البسيطة : نستخدم ثنائي ، ثلاثي ، رباعي ، (ولا نذكر احادي) قبل اسماء الليكنندات البسيطة وذلك للدلالة على عدد الليكنندات والليكنندات البسيطة مثل برومو ونايترو وغيرها .

(2) الليكنندات المعقدة : نستخدم (بس) للثنائي و (ترس) للثلاثي كما في

. (en) ، (dmg^-) ، $(C_2O_4^{2-})$ ، $(NH_2)_2CO$ ، $(EDTA)$.

(7) نسمي الذرة المركزية في الايون المعقد الموجب بعد تسمية الليكنندات حيث نذكر اسم الذرة المركزية كما هو ثم عدد التأكسد بالارقام الرومانية وهي (I ، II ، III ، IV ، V ، VI ، +1 ، +2 ، +3 ، +4 ، +5 ، +6) على التوالي ، اما عدد تأكسد صفر فيكتب (0) وتوضع اعدد التاكسد دائماً بين قوسين () .

(8) اما عندما يكون الايون المعقد سالباً والايون البسيط موجباً ، فالتسمية كما هي في القواعد اعلاه ولكن بأضافة المقطع (ات) الى نهاية اسم الفلز مثال الكروم يصبح (كرومات) والنيكل (نيكلات) اما الحديد فيسمى (فيرات) .

(9) اذا كان المعقد التناسقي متعادلاً فيسمى كما في القواعد اعلاه اي بدون اضافة المقطع (ات) كما في الايون المعقد الموجب كما في $[Co(NH_3)_3Cl_3]$.

(10) عند وجود ايون معقد (موجب او سالب) فنذكر كلمة ايون قبل التسمية ونفس القواعد اعلاه مثال $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$.

سمي المعقدات التناسقية الآتية :

سؤال



$$X + (0 \times 4) + (-1 \times 2) = +1$$



$$X - 2 = +1 \Rightarrow X = +3$$

كلوريد رباعي اكوا ثنائي كلورو الكروم (III)

$$X + (0 \times 4) = 0$$



$$X = 0$$

رباعي كاربونيل النيكل (0)

$$X + (-1 \times 6) = -4$$

$$X - 6 = -4 \Rightarrow X = +2$$

$$X + (-1 \times 2) = 0$$

$$X = 2$$

$$X + (0 \times 5) + 0 = +3$$

$$X = +3$$

$$X + (0 \times 2) = +2$$

$$X = 2$$

$$X + (-1 \times 6) = -2$$

$$X = +4$$



سداسي سيانو فيرات (II) الكالسيوم



بس(ثنائي مثيل كلايكسيماتو) نيكل (II)



كلوريد اكوا خماسي امين كوبلت (III)



كلوريد بس (اثيلين ثنائي امين) نحاس (II)



سداسي ثايوسياناتو كرومات (IV) امونيوم

$$X + (-1 \times 6) = -3 \Rightarrow X - 6 = -3 \Rightarrow X = +3 \quad K_3[Fe(CN)_6] \quad (8)$$

سداسي سيانو فيرات (III) البوتاسيوم



$$X + (-1 \times 1) + (0 \times 5) = +2 \Rightarrow X = +3 \quad \text{كبريتات خماسي امين ازيدو الكوبلت (III)}$$



$$X + (0 \times 6) = +2 \quad \text{كبريتات سداسي اكوا حديد (II)}$$


$$X = 2$$




$$X + (-1 \times 6) = -2 \Rightarrow X = +4 \quad \text{سداسي كلورو بلاتينات (IV) البوتاسيوم}$$

اكتب الصيغ التركيبية للمركبات التناسقية الآتية :


سؤال




أ) نترات ترس (اثيلين ثنائي امين) كوبلت (III)



ب) رباعي سيانو نيكلات (0) البوتاسيوم



ج) ايون اكوا بس او كزالاتو كرومات (III)



هـ) رباعي كلورو نيكلات (II) البوتاسيوم



ط) ايون اكوا سيانو بس (اثيلين ثنائي امين) الكوبلت (III)

نظرية اصرة النكافؤ (VBT)

نظرية اصرة النكافؤ (VBT)



وهي النظرية التي تعد تكوين المركبات التناسقية هو تفاعلاً بين حامض لويس (الفلز) وقاعدة لويس (الليكند) مع تكوين اصرة تناسقية بينهما ، وهي ذات علاقة وثيقة بالتهجين والشكل الهندسي للمعقدات . وتمثل في النظرية اوربيتالات الفلز بمربعات لبيان توزيع الكترونات الغلاف الخارجي للفلز والالكترونات الالية من الليكندات .

اهميتها :

- 1) معرفة نوع التهجين للذرة المركزية وهو اربعة انواع (sp ، sp^2 ، sp^3 ، dsp^2) .
 - 2) معرفة الشكل الهندسي للمركب التناسقي (خطي مستقيم ، مثلث مستو ، رباعي الاوجه منتظم ، مربع مستو) على التوالي .
 - 3) معرفة الحالة المغناطيسية للمعقد التناسقي فيما اذا كانت بارامغناطيسية (عند وجود الكترونات منفردة في d) او ديامغناطيسية (عند عدم وجود الكترونات منفردة في d اي جميع الالكترونات مزدوجة) .
 - 4) حساب الزخم المغناطيسي μ وفق المعادلة الالية : $\mu(B.M) = \sqrt{e(e+2)}$ حيث ان $e =$ عدد الالكترونات المنفردة ، B.M هي وحدة قياس الزخم المغناطيسي .
- 1) الاعداد التناسقية المستخدمة في هذه النظرية هي (2 ، 3 ، 4) فقط .
- 2) الايون المركزي للمعقد التناسقي يتكون من العناصر الانتقالية الرئيسية وهي ثلاث مجاميع وكالاتي :

الترتيب الالكتروني	العدد الذري	رقم السلسلة
$18[Ar] 3d^{(1-10)} 4s^2 4p^0$	21 – 30	الاولى
$36[Kr] 4d^{(1-10)} 5s^2 5p^0$	39 – 48	الثانية
$54[Xe] 4f^{14} 5d^{(1-10)} 6s^2 6p^0$	71 – 80	الثالثة

- 3) العنصر الانتقالي يفقد الكتروناته اولاً من المستوى الثاني ns ثم من المستوى $(n - d)$ 1) (اذا كان يفقد اكثر من الكترونين) .
- 4) لنوع الليكند تأثير على خواص المركب (ذات عدد تناسق = 4 فقط) لذلك يجب معرفة نوع الليكند من حيث القوة وهذا يخص عناصر السلسلة الاولى فقط اما السلسلة الثانية والثالثة فالليكندات تكون جميعها قوية وهذا التصنيف الى ليكندات قوية (ضاغطة) وليكندات ضعيفة (غير ضاغطة) وفق سلسلة الطيف الكيميائي وكالاتي :

H_2O	OH^-	I^-	F^-	Cl^-	Br^-	الليكندات الضعيفة (غير ضاغطة)
C_5H_5N	dmg^-	en	NO_2^-	CO	NH_3	الليكندات القوية (ضاغطة)


تطبيق نظرية اصرة التكافؤ (VBT)

(1) اذا كان العدد التناسقي 2


مثال

اعتماداً على نظرية اصرة التكافؤ VBT بين توزيع الكترونات الفلز والالكترونات الاتية من الليكندات للايون المعقد ثنائي امين الفضة (I) $[Ag(NH_3)_2]^+$ ، ثم جد نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية ، والزخم المغناطيسي ؟ (العدد الذري للفضة يساوي 47) .


(1) الترتيب الالكتروني لعنصر الفضة :



(2) الترتيب الالكتروني لايون الفضة :



(3) الترتيب الالكتروني لايون الفضة في المعقد :



- اربعة الكترونات اتية من ليكندين (N هي الذرة المانحة)
- نوع التهجين sp من اشتراك اوربيتال واحد من s واوربيتال واحد من p .
- الشكل الهندسي خطي مستقيم .
- الصفة المغناطيسية دايا مغناطيسية لعدم وجود الكترونات منفردة .
- الزخم المغناطيسي $\mu(B.M) = \sqrt{e(e+2)} = 0$


(2) اذا كان العدد التناسقي 3




(2016/د-2 - خ ق)

اعتماداً على نظرية اصرة التكافؤ VBT بين توزيع الكترونات الفلز والالكترونات الاتية من الليكندات لايون المعقد $[HgI_3]^-$ ثلاثي يودو زئبقات (II) ، ثم جد نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية والزخم المغناطيسي (العدد الذري للزئبق = 80)

(1) الترتيب الالكتروني لعنصر الزئبق :

(2) الترتيب الالكتروني لايون الزئبق : $X + (-1 \times 3) = -1 \Rightarrow X = +2$ 

(3) الترتيب الالكتروني لايون الزئبق في المعقد :



- ستة الكترونات اتية من ثلاث ليكندات

- نوع التهجين sp^2 من اشتراك اوربيتال واحد من s واوربيتالين من p .

- الشكل الهندسي مثلث مستو .

- الصفة المغناطيسية دايا مغناطيسية لعدم وجود الكترونات منفردة (جميعها مزدوجة) .

- الزخم المغناطيسي : $\mu(B.M) = \sqrt{e(e+2)} = 0$

(3) اذا كان العدد التناسقي 4 اولاً// عناصر السلسلة الانتقالية الاولى :


اعتماداً على نظرية اصرة التكافؤ VBT بين توزيع الكترونات الفلز والالكترونات الاتية من الليكندات لايون المعقد $[NiCl_4]^{2-}$ رباعي كلورو نيكلات (II) ، ثم جد نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية والزخم المغناطيسي (العدد الذري للنيكل = 28)



(1) الترتيب الالكتروني لعنصر النيكل :





$$X + (-1 \times 4) = -2 \Rightarrow X = +2$$



(2) الترتيب الالكتروني لايون النيكل :

(3) الترتيب الالكتروني لايون النيكل في المعقد :



- ثمانية الكترونات اتية من اربع ليكندات

- نوع التهجين sp^3 من اشتراك اوربيتال واحد من s وثلاث اوربيتالات من p .

- الشكل الهندسي رباعي الاوجة منتظم.


- الصفة المغناطيسية بارامغناطيسي لوجود الكترولين غير مزدوجين.

$$\sqrt{2(2+2)} = \sqrt{8} = 2.82 B.M \mu(B.M) = \sqrt{(e+2)}$$


مثال

اعتماداً على نظرية اصرة التكافؤ VBT بين توزيع الكترونات الفلز والالكترونات الاتية من الليكندات للايون المعقد $[Ni(CN)_4]^{2-}$ رباعي سيانو نيكلات (II)، ثم جد نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية والزخم المغناطيسي μ ، (العدد الذري للنيكل يساوي 28)

(1) الترتيب الالكتروني لعنصر النيكل :




$$X + (-1 \times 4) = -2 \Rightarrow X = +2$$



(2) الترتيب الالكتروني لايون النيكل :

(3) الترتيب الالكتروني لايون النيكل في المعقد :



- ثمانية الكترونات آتية من اربع ليكنيدات (C) هى الذرة المانحة
- نوع التهجين dsp^2 من اشتراك اوربيتال واحد من s .
- واوربيتالين من P واوربيتال واحد من d .
- الشكل الهندسي مربع مستوي .
- الصفة المغناطيسية دايا مغناطيسي لان جميع الالكترونات مزدوجة .
- الزخم المغناطيسي : $\mu(B.M) = \sqrt{e(e+2)} = 0$

سؤال

للأيون المعقد $[NiCl_4]^{2-}$ صفات بارامغناطيسية بينما للأيون المعقد $[Ni(CN)_4]^{2-}$ صفات دايا مغناطيسية ، علل ذلك ؟ (او قارن بين المعقدين التناسقيين) .

بسبب نوع الليكند حيث الكلوريد في الأيون المعقد $[NiCl_4]^{2-}$ ليكند ضعيف غير ضاغط مما يجعل الكترونين منفردين غير مزدوجين في المستوى d أما السيانيد في لأيون المعقد $[Ni(CN)_4]^{2-}$ فهو ليكند قوي ضاغط حيث تزوج الالكترونات في المستوى d .

(1) $[Co(CN)_4]^{2-}$ (2) $[CoCl_4]^{2-}$

واجب

واجب

- (3) لنفرض ان للكوبلت (II) المعقد $[Co(L)_4]^{2+}$ حيث ان L يمثل ليكند احادي المخلب . اكتب تهجين هذا المعقد ثم جد الزخم المغناطيسي (العدد الذري الكوبلت يساوي 27) .


ثانياً // عناصر السلسلتين الانتقالتين الثانية والثالثة :

المعقدات رباعية التناسق لعناصر السلسلة الانتقالية الثانية والثالثة تكون ذات اشكال هندسية من نوع مربع مستوي (تهجين dsp^2) بغض النظر عن كون الليكند قوياً او ضعيفاً ، علل ذلك ؟

وذلك بسبب كبر حجم الايونات في السلسلة الانتقالية الثانية والثالثة مقارنة بحجم الايونات في السلسلة الانتقالية الاولى .



لماذا المعقد $[NiCl_4]^{2-}$ بارامغناطيسي بينما المعقد $[PtCl_4]^{2-}$ دايامغناطيسي ؟
وضح ذلك وفق نظرية اصرة التكافؤ ؟ (الاعداد الذرية للنكل يساوي 28 ، البلاتين
يساوي 78) .



نكتب الترتيب الالكتروني للايون المركزي في الايونين المعقدين :

(1) الترتيب الالكتروني لعنصر النيكل :





(2) الترتيب الالكتروني لايون النيكل :

$$X + (-1 \times 4) = -2 \Rightarrow X = +2$$



(3) الترتيب الالكتروني لايون النيكل في المعقد :




(1) الترتيب الالكتروني لعنصر البلاتين :




(2) الترتيب الالكتروني لايون البلاتين :

$$X + (-1 \times 4) = -2 \Rightarrow X = +2$$



(3) الترتيب الالكتروني لايون البلاتين في المعقد :




- الايون المعقد $[NiCl_4]^{2-}$ بارامغناطيسي وذلك لان عنصر النيكل من عناصر السلسلة الاولى وان الكلوريد ليكنذ ضعيف غير ضاغط للالكترونات المنفردة ، اما
- الايون المعقد $[PtCl_4]^{2-}$ فهو دايا مغناطيسي وذلك لان عنصر البلاتين من عناصر السلسلة الثالثة وفي هذه السلسلة تكون جميع الالكندات قوية ضاغطة للالكترونات المنفردة .

نمبرن 8

اعتماداً على نظرية اصرة التكافؤ (VBT) المعقد ، ما نوع التهجين والشكل الهندسي والصفة المغناطيسية للمعقدين $[PdCl_4]^{-2}$ و $[Co(H_2O)_4]^{2+}$ ثم احسب μ لكل منهما (العدد الذري للبلاديوم يساوي 46 والكوبلت 27) .




(1) الترتيب الالكتروني لعنصر البلاديوم : (Pd من عناصر السلسلة الثانية)




$$X + (-1 \times 4) = -2 \Rightarrow X = +2$$

(2) الترتيب الالكتروني لايون البلاديوم :




(3) الترتيب الالكتروني لايون البلاديوم في المعقد :



- نوع التهجين dsp^2 ، الشكل الهندسي مربع مستوي ، الصفة المغناطيسية دايا مغناطيسية لعدم وجود إلكترونات منفردة ، الزخم المغناطيسي $\mu(B.M) = \sqrt{(e(e+2))} = 0$ $[Co(H_2O)_4]^{2+}$

(1) الترتيب الالكتروني لعنصر الكوبلت :



$$X + (0 \times 4) = +2 \Rightarrow X = +2$$

(2) الترتيب الالكتروني لايون الكوبلت :



(3) الترتيب الالكتروني لايون الكوبلت في المعقد :



- نوع التهجين sp^3 ، الشكل الهندسي رباعي الاوجة منتظم ، الحالة المغناطيسية بارامغناطيسي


- الزخم المغناطيسي : $\mu(B.M) = \sqrt{(e(e+2))} = \sqrt{15} = 3.87 B.M$



سؤال 10

اعتماداً على نظرية اصرة التكافؤ (VBT) أجب عن الاسئلة التالية لكل من المركبات التناسقية الآتية : $[Zn(CN)_4]^{2-}$ ، $[Ni(dmg)_2]$ ، $[ZnCl_2(NH_3)_2]$
 أ) ما نوع التهجين للذرة المركزية ب) ما الشكل الهندسي للمعقد ج) ما الصفة المغناطيسية للمعقد ؟

(2018 / 2د - قارن مع $[Pd(CN)_4]^{2-}$) $[Zn(CN)_4]^{2-}$

(1) الترتيب الالكتروني لعنصر الخارصين :






- نوع التهجين sp^3 ، الشكل الهندسي رباعي الاوجة منتظم .
- الحالة المغناطيسية دايامغناطيسي لعدم وجود الكترون منفرد (CN^- ليكن قوي ضاغط ولكن d ممتلئ)




(1) الترتيب الالكتروني لعنصر النيكل :



(2) الترتيب الالكتروني لايون النيكل : $X + (-1 \times 2) = 0 \Rightarrow X = +2$



(3) الترتيب الالكتروني لايون النيكل في المعقد :




- نوع التهجين dsp^2
- الشكل الهندسي مربع مستوي .
- الصفة المغناطيسية دايامغناطيسي لان جميع الالكترونات مزدوجة .




(1) الترتيب الالكتروني لعنصر الخارصين :



(2) الترتيب الالكتروني لايون الخارصين : $X + (-1 \times 2) + (0 \times 2) = 0 \Rightarrow X = +2$



(3) الترتيب الالكتروني لايون الخارصين في المعقد :



الفصل السادس - الكيمياء التحليلية

التحليل (الوصفي) النوعي:

وهي مجموعة من طرائق التحليل الكيميائي تهدف الى معرفة هوية مكون واحد او اكثر من مكونات مادة او مزيج من المواد والاسلوب الذي ترتبط به هذه المكونات بعضها ببعض الآخر .

المجاميع الخمسة من الايونات الموجبة وعواملها المرسبة والصبغ الكيميائية للرواسب الناتجة:

التأكيد على العامل المرسب وصيغة الترسيب

المجموعة	العامل المرسب للمجموعة	ايونات المجموعة	صيغة الراسب
I	حامض HCl المخفف	Ag^+ ، Hg_2^{2+} ، Pb^{2+} رصاص ، زئبقوز ، فضة	Hg_2Cl_2 ، $PbCl_2$ ، $AgCl$ (على هيئة كلوريدات)
II	كبريتيد الهيدروجين H_2S بوجود HCl المخفف (2019/د-1 خ ق) العامل المرسب	Sn^{2+} ، Cu^{2+} ، Pb^{2+} ، Hg^{2+} ، Cd^{2+} رصاص ، كاديوم ، قصدير ، نحاس ، زئبقيك Bi^{3+} ، As^{3+} ، Sb^{3+} انتيومون ، زرنيخ ، يزموت	PbS ، CuS ، HgS ، SnS ، CdS ، As_2S_3 ، Sb_2S_3 ، Bi_2S_3 (على هيئة كبريتيدات)
III	A هيدروكسيد الامونيوم NH_4OH مع كلوريد الامونيوم NH_4Cl	Al^{3+} ، Cr^{3+} ، Fe^{3+} حديدك ، كروم ، المنيوم	$Cr(OH)_3$ ، $Al(OH)_3$ ، $Fe(OH)_3$ (على هيئة هيدروكسيدات)
B	كبريتيد الهيدروجين H_2S بوجود NH_4Cl و NH_4OH	Zn^{2+} ، Co^{2+} ، Mn^{2+} ، Ni^{2+} منغنيز ، كوبلت ، خارصين ، نيكل	NiS ، ZnS ، CoS ، MnS (على هيئة كبريتيدات)
IV	$(NH_4)_2CO_3$ بوجود NH_4Cl و NH_4OH (2017/د-1 خ ق)	Ca^{2+} ، Ba^{2+} ، Sr^{2+} سترونشيوم ، باريوم ، كالسيوم	$CaCO_3$ ، $BaCO_3$ ، $SrCO_3$ (على هيئة كربونات)
V	تبقى في المحلول النهائي بدون ترسيب	K^+ ، Na^+ ، Mg^{2+} ، NH_4^+ امونيوم ، مغنيسيوم ، صوديوم ، بوتاسيوم	

يصنف ايون الرصاص Pb^{2+} ضمن المجموعتين I و II ؟

سؤال

وذلك لكون ذوبانية كلوريد الرصاص $PbCl_2$ كبيرة نسبياً مما يسبب بعض الاحيان عدم ترسبه بشكل تام عند اضافة HCl .

كيف يمكن الفصل بين ايونات الفضة والكاديوم والحديد (III) ؟

مثال 1

بما ان ايون الفضة Ag^+ يصنف ضمن المجموعة I ويفصل بأضافة محلول HCl المخفف ليترسب على هيئة كلوريد الفضة $AgCl$ ، ثم يفصل بالترشيح ، وايون

الكاديوم Cd^{2+} ضمن المجموعة II ويفصل بأمرار غاز H_2S الحمض فيترسب على هيئة CdS ثم يفصل بالترشيح ، وايون الحديد (III) Fe^{3+} يصنف ضمن المجموعة الثالثة A ، حيث يبقى لوحده في المحلول بعد ترسيب Ag^+ و Cd^{2+} ويتم ترسيبه بأضافة محلول NH_4OH و NH_4Cl على هيئة هيدروكسيد الحديد (III) $Fe(OH)_3$.
وبنفس الطريقة يكون الحل لكافة الاسئلة من هذا النوع .

الأنحليل الكمي:



وهي مجموعة من طرائق التحليل الكيميائي التي تهدف الى ايجاد كمية مكون معين في كمية معينة من النموذج .

الخطوات التي تسبق عملية التحليل الكمي :



- (1) **النمذجة :** أي الحصول على النموذج بشكل صحيح يمثل العينة بالاختصاص اذا كانت العينة غير متجانسة .
- (2) **اعداد النموذج :** وتشمل عمليات الطحن والمجانسة والتخلص من الرطوبة للنموذج (العينة) .
- (3) **قياس كمية النموذج :** أي قياس كتلة النموذج او حجمه بشكل دقيق .
- (4) **اذابة النموذج :** اي بأذابته في مذيب مناسب للحصول على محلول يصلح لعملية التحليل الكيميائي الكمي .
- (5) **فصل المتداخلات :** اي فصل المكونات الموجودة اصلاً في النموذج والتي تسبب تداخلاً في عملية التحليل الكيميائي (اي تؤثر سلباً على عملية التحليل الكيميائي) .

(1) طرائق التحليل الوزني :



وهي مجموعة من طرائق التحليل الكيميائي الكمي تعتمد على عزل وقياس كتلة مادة معلومة التركيب الكيميائي تحوي المكون المراد تقديره بشكل نقي وكمي عن كتلة معلومة من العينة المراد تقديرها .

ويمكن انجاز خطوة عزل بعدة طرائق منها :

طرائق التطاير، طرائق الترسيب ، طرائق الترسيب الكهربائي ، طرائق فيزيائية اخرى .

(أ) طرائق التطاير :

وهي مجموعة من طرائق التحليل الوزني التي تعتمد على ازالة المكون المتطاير(الذي يتحول الى حالة غازية او بخارية) الموجود في العينة ومن ثم ايجاد كتلته بطريقة مباشرة او غير مباشرة .

(1) طريقة التطاير المباشرة :



وهي الطريقة التي تعتمد على ازالة المكون المتطاير الموجود في العينة ومن ثم ايجاد كتلته عن طريق امتصاص المادة المتطايرة في وسط مناسب ويتم ايجاد كتلتها بصورة مباشرة .



عند حرق 5.7 mg من مركب عضوي نتج 14.4 mg من غاز ثنائي اوكسيد الكربون و 2.5 mg من بخار الماء احسب النسبة المئوية للكربون والهيدروجين في المركب .

نحسب كتلة الكربون من كتلة CO_2 ، وكتلة الهيدروجين من كتلة H_2O ، وهي طريقة تطاير مباشرة :

(1) نجد % للكربون :

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2$$

$$m_C = m_{CO_2} (mg) \times \frac{M_C (g/mol)}{M_{CO_2} (g/mol)} = 14.4 \text{ mg} \times \frac{12 (g/mol)}{44 (g/mol)} = 3.94 \text{ mg}$$

$$\% C = \frac{m_C}{m_{\text{المركب}}} \times 100 = \frac{3.94 \text{ mg}}{5.7 \text{ mg}} \times 100 = 68.9 \%$$

(2) نجد % للهيدروجين :

$$m_H = m_{H_2O} (mg) \times \frac{M_{H_2} (g/mol)}{M_{H_2O} (g/mol)} = 2.5 \text{ mg} \times \frac{2 (g/mol)}{18 (g/mol)} = 0.28 \text{ mg}$$

$$\% H = \frac{m_H}{m_{\text{المركب}}} \times 100 = \frac{0.28 \text{ mg}}{5.7 \text{ mg}} \times 100 = 4.9 \%$$


(الكتل المولية تعطى في السؤال) .

عند حرق 5.7 mg من مركب عضوي هيدروكربوني ينتج من عملية احتراقه التام 15.675 mg من CO_2 . فإن النسبة المئوية للهيدروجين في المركب = 25 % .

(نجد % للكربون ومنها نجد % للهيدروجين من الفرق او الطرح من 100 %) .

(2) طريقة التطاير غير المباشرة : وهي الطريقة التي تعتمد على ازالة المكون المتطاير الموجود في العينة ومن ثم ايجاد كتلته من النقص الحاصل في الكتلة قبل وبعد عملية التطاير .

تم تحليل عينة كتلتها 1.451 g من ملح كلوريد الباريوم المائي النقي $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ لمعرفة النسبة المئوية لماء التبلور فيها وذلك باتباع طريقة التطاير غير المباشرة . تم تسخين العينة لمدة كافية عند درجة حرارة 125°C ، وبعد التبريد في محيط جاف ، وجد ان كتلة الجزء غير المتطاير كانت تساوي 1.236 g . احسب النسبة المئوية لماء التبلور في العينة .



$$m_{H_2O}(g) = 1.451 (g) - 1.236 (g) = 0.215 \text{ g}$$

$$\% \text{H}_2\text{O} = \frac{m_{H_2O}(g)}{m_{\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}}(g)} \times 100 = \frac{0.215(g)}{1.451(g)} \times 100 = 14.81\%$$

طريقة تطاير غير مباشرة لان كتلة الجزء المتطاير (H_2O) تم ايجادها من الفرق في الكتلة قبل وبعد التسخين





ب (طرائق الترسيب :

وهي مجموعة من طرائق التحليل الوزني المعتمدة على تحويل المكون المراد تقديره في العينة الى مركب نقي ومستقر كيميائياً ذو صيغة كيميائية معلومة قابلة للوزن عن طريق تفاعلات الترسيب .

خطوات طرائق الترسيب :

- (1) اذابة ووزن كتلة معلومة ومضبوطة من العينة بمذيب مناسب .
- (2) ترسيب المكون المراد تقديره من محلول العينة على هيئة راسب وبصيغة كيميائية معلومة تدعى صيغة الترسيب وذلك بأضافة كاشف كيميائي مناسب يدعى العامل المرسب .
- (3) فصل وعزل الراسب بالترشيح .
- (4) غسل الراسب بعد فصله بالترشيح وهو على ورقة الترشيح بأضافة محلول غسيل ملائم على الراسب .

محلول الغسيل :



- اهميته :** للتخلص من كمية الملوثات العالقة على سطح الراسب .
- شروطه :** (1) ان لا يؤثر على ذوبانية الراسب بل يساعد على ذوبان الملوثات فقط .
- (2) ان لا يكون مركبات متطايرة مع الراسب .
- (3) ان يكون المحلول المستعمل لغسل الراسب سهل التطاير للتخلص منه لاحقا .
- (5) تجفيف الراسب :
- اي تحويل الراسب من صيغة الترسيب الى صيغة وزنية ملائمة وذلك من خلال عملية التجفيف او الحرق .
- (6) وزن الراسب وهو على هيئة صيغة وزنية لايجاد كتلته بشكل دقيق .

عوامل نجاح التحليل الوزني بطريقة الترسيب :



- (1) يجب ان يكون الراسب المتكون غير ذائب بدرجة كافية (قابلية ذوبان قليلة جداً) علل ذلك ؟ .
- ج/ لاجل عدم حصول خسارة ملحوظة للمكون المراد تقديره عند جمعه بعملية الترشيح .
- (2) ان يتمتع الراسب بصفات فيزيائية مناسبة تمكن من الفصل منها ، تكون دقائق الراسب ذات حجم كبير نسبياً وان يكون الراسب بلورياً ان لا يتأثر حجم هذه الدقائق بعملية الغسل .
- (3) ان تكون هناك امكانية لتحويل الراسب الى مادة نقية وذات صيغة كيميائية معلومة وثابتة (صيغة وزنية) ، ويتم ذلك عن بالتجفيف او الحرق او معاملة الراسب بكواشف كيميائية مناسبة .

العوامل (الشروط) المؤثرة على حجم دقائق الراسب :



1 (طبيعة الراسب وتركيبه الكيميائي :

مثل $BaSO_4$ تميل الى تكوين راسب بلوري مقارنة مع $AgCl$ وتحت نفس الظروف .

2 (ذوبانية الراسب :

حيث تميل الرواسب ذات الذوبانية العالية نسبياً الى تكوين رواسب بلورية والعكس صحيح .

3 (درجة الحرارة :

ان اجراء عملية الترسيب عند درجات حرارة عالية يؤدي الى تكوين راسب متبلور ، علل ذلك ؟
ج/ وذلك لان رفع درجة الحرارة يؤدي الى زيادة ذوبانية معظم الرواسب اي ببطء الترسيب
واتاحة الوقت اللازم لبناء بلورات .

4 (تراكيز المواد التي تشترك في عملية الترسيب :

يفضل اجراء عملية الترسيب في محاليل مخففة للمكون المراد تقديره وللعامل المرسب
علل ذلك ؟ لان ذلك يؤدي الى ببطء الترسيب مما يعطي فرصة لبناء بلورات الراسب .

الحسابات في الترسيب : وكما في القوانين الثلاثة الاتية :



$$G_f = \frac{a}{b} \times \frac{M_{\text{(المكون المراد تقديره)}} (g/mol)}{M_{\text{(الصيغة الوزنية)}} (g/mol)}$$

$$\% \text{ المكون المراد تقديره} = \frac{m_{\text{المكون}}}{m_{\text{العينة}}} \times 100$$

$$m_{\text{(المكون المراد تقديره)}} (g) = G_f \times m_{\text{(الصيغة الوزنية)}} (g)$$

المعامل الوزني G_f :

هو النسبة بين الكتلة المولية للمكون المراد تقديره الى الكتلة المولية للصيغة الوزنية
(الراسب) على شرط ان تحوي كلتا الصيغتين على نفس العدد من ذرات العنصر (او جزيئات)
المكون المراد تقديره وهو خالي من الوحدات .

احسب المعامل الوزني للحديد ($M = 56 \text{ g/mol}$) في Fe_2O_3 ($M = 160 \text{ g/mol}$)

سؤال



$$G_f = \frac{a}{b} \times \frac{M_{Fe} (g/mol)}{M_{Fe_2O_3} (g/mol)} = \frac{2}{1} \times \frac{56 (g/mol)}{160 (g/mol)} = 0.7$$

سؤال



احسب المعامل الوزني لـ $Na_5P_3O_{10}$ ($M = 368 \text{ g/mol}$) في $Mg_2P_2O_7$ ($M = 222 \text{ g/mol}$) .

$$G_f = \frac{a}{b} \times \frac{M_{Na_5P_3O_{10}} (g/mol)}{M_{Mg_2P_2O_7} (g/mol)} = \frac{2}{3} \times \frac{368 (g/mol)}{222 (g/mol)} = 1.1$$

كم هو عدد غرامات يودات البوتاسيوم KIO_3 اللازمة لترسيب 1.67 g من يودات
الرصاص $Pb(IO_3)_2$ ؟

سؤال



$$G_f = \frac{a}{b} \times \frac{M_{KIO_3} (g/mol)}{M_{Pb(IO_3)_2} (g/mol)} = \frac{2}{1} \times \frac{214 (g/mol)}{557 (g/mol)} = 0.768 \quad \text{1) نجد } G_f :$$

$$m_{KIO_3} (g) = G_f \times m_{Pb(IO_3)_2} = 0.768 \times 1.67 \text{ g} = 1.283 \text{ g} \quad \text{2) نجد } m_{Cl} :$$

سؤال




عند اذابة 0.5 g من ملح غير نقي ليوديد الصوديوم NaI ($M = 150 \text{ g/mol}$) في الماء واضافة زيادة من محلول نترات الفضة $AgNO_3$ لترسيب ايون اليوديد بشكل تام ، تم الحصول على 0.744 g من يوديد الفضة AgI ($M = 235 \text{ g/mol}$) احسب النسبة المئوية ليوديد الصوديوم في الملح غير النقي .

$$G_f = \frac{a}{b} \times \frac{M_{NaI} (g/mol)}{M_{AgI} (g/mol)} = \frac{1}{1} \times \frac{150 (g/mol)}{235 (g/mol)} = 0.638 \quad \text{نجد } G_f:$$

$$m_{NaI} = G_f \times m_{AgI} = 0.638 \times 0.744 \text{ g} = 0.475 \text{ g} \quad \text{نجد } m_{NaI}:$$


$$\%NaI = \frac{m_{NaI}}{m_{العينة}} \times 100 = \frac{0.475 \text{ g}}{0.5 \text{ g}} \times 100 = 95 \% \quad \text{نجد } \% NaI:$$

واجب



احسب النسبة المئوية للفسفور الموجود في نموذج من الفوسفات وزنه 0.68 g تم ترسيبه ثم احرق واصبح على هيئة بايروفوسفات المغنيسيوم $Mg_2P_2O_7$ والذي كان وزنه النهائي 0.435 g ، علماً ان الكتل الذرية لـ $O = 16$ ، $P = 31$ ، $Mg = 24$

واجب



احسب المعامل الوزني لـ MgI_2 ($M = 278 \text{ g/mol}$) في AgI ($M = 235 \text{ g/mol}$)

النماذج الحجمية



وهو احدى طرائق التحليل الكيميائي الكمي التي تعتمد بالاساس على قياس الحجم الذي يستهلك من محلول لكاشف كيميائي (محلول قياسي - ذي تركيز معلوم بدقة) عند تفاعله كميًا مع محلول المكون المراد تقديره (محلول ذو تركيز مجهول) .

المحلول القياسي:



هو ذلك المحلول الذي يحوي حجم معين منه على كمية محددة ومعلومة من الكاشف (عدد غرامات او عدد مولات او عدد غرامات مكافئة . . .) وهو على نوعين محلول قياسي اولي ومحلول قياسي ثانوي .

شروط المحاليل القياسية :



- (1) يجب ان تكون ذات نقاوة عالية .
- (2) يجب ان لا تتفاعل او تمتص مكونات الهواء الجوي (H_2O او CO_2 او O_2) .
- (3) يفضل ان يكون لها كتلة مكافئة EM عالية لتقليل الخطأ الذي قد ينتج في اثناء عملية الوزن علل ذلك ؟
- (4) يجب ان تكون قابلة للذوبان في المذيب المستعمل (الماء دائماً) .

(5) يفضل ان لا تكون سامة .

(6) ان تكون رخيصة الثمن ومتوفرة .

النسج:

وهو عملية الاضافة التدريجية للمحلول القياسي من السحاحة الى المحلول المجهول في دورق ايرلنماير او بالعكس لحين اكتمال التفاعل بين الكاشف الكيميائي المضاف والمكون المراد تقديره والوصول الى نقطة نهاية التفاعل .

نقطة النكافؤ:

هي نقطة نظرية (افتراضية) يكون من المفروض عندها ان تتكافئ كمية المادة القياسية المضافة من السحاحة مع كمية المادة المجهولة الموجودة في الدورق المخروطي ، ويمكن تحديدها من خلال تغير لون المحلول او تكون راسب ويمكن تمييز ذلك بسهولة بالعين المجردة .

نقطة نهاية النفاعل:

هي نقطة ينتهي (يكتمل) عندها التفاعل المستعمل في عملية التسحيح بين المادة القياسية والمادة المجهولة ويحدد موقعها عملياً بالاعتماد على احد الدلائل المناسبة .

الدلائل:

هي مواد كيميائية تضاف عادة الى محلول التسحيح ولا تشترك في التفاعل بل يتغير لونها او احدى صفاتها الفيزيائية بشكل واضح عند نقطة نهاية التفاعل .

شروط التفاعلات الكيميائية في عملية التسحيح :

- (1) يجب ان يكون التفاعل بسيطاً ويمكن التعبير عنه بمعادلة كيميائية موزونة .
- (2) يجب ان يتجه التفاعل باتجاه واحد (تفاعل غير انعكاسي) .
- (3) يجب ان يكون التفاعل سريع جداً ، او اضافة عامل مساعد لزيادة السرعة .
- (4) يجب ان تتوفر وسيلة لتعيين نقطة نهاية التفاعل عن طريق حصول تغير ملحوظ في صفات المحلول .

انواع التفاعلات الكيميائية المستخدمة في عملية التسحيح :

- (1) تفاعلات الحوامض والقواعد (تفاعلات التعادل) (2) تفاعلات التأكسد والاختزال
- (3) تفاعلات الترسيب (4) تفاعلات تكوين معقد

طرق التعبير عن تراكيز المحاليل المستعملة في عمليات التسحيح :

(1) التركيز المولاري : هو عدد المولات المذابة في لتر واحد من المحلول .

$$M = \frac{m(g)}{M(g/mol)} \times \frac{1}{V(L)} \quad m(g) = M (mol/L) \times V(L) \times M(g/mol)$$

(2) التركيز العياري (النورمالي) : هو عدد المكافئات الغرامية المذابة في لتر واحد من المحلول .

$$N = \frac{m(g)}{EM(g/eq)} \times \frac{1}{V(L)} \quad m(g) = N (eq/L) \times V(L) \times EM(g/eq)$$

الكثلة المكافئة (EM) :

وهي كتلة المادة التي تنتج او تستهلك مولاً واحداً من المكون الفعال (الذي يشترك في التفاعل) وهي كمية غير ثابتة اي تتغير مع تغير نوع التفاعل الكيميائي الذي تشترك فيه المادة .

الكثلة المكافئة للحامض:

وهي كتلة الحامض التي تحوي على مول واحد من ذرات الهيدروجين القابلة للإبدال في التفاعل .

الكثلة المكافئة للقاعدة :

وهي كتلة القاعدة التي تحوي على مول واحد من مجاميع الهيدروكسيد القابلة للإبدال في التفاعل .

الكثلة المكافئة لمادة نشترك في تفاعل ترسيب:

هي كتلة المادة التي تحوي او تتفاعل مع مول واحد من ايون موجب احادي الشحنة .

الكثلة المكافئة لمادة نشترك في تفاعل تكوين معقد:

هي كتلة المادة التي تهب او تكتسب مزدوح الكتروني واحد .

الكثلة المكافئة للعامل المختزل او العامل المؤكسد :

هي كتلة المادة التي تفقد او تكتسب الكترونات واحداً في التفاعل الكيميائي

$$EM = \frac{M}{\eta}$$

العلاقة بين M و EM :

حيث η (ايتا) تمثل عدد مولات الجزء الفعال الذي يشترك في التفاعل الكيميائي وتكون عدداً صحيحاً $\eta \geq 1$

$$N = M \times \eta$$

العلاقة بين المولارية M والنورمالية N :

كيفية حساب (η) عدد مولات الجزء الفعال والكتلة المكافئة EM:

(1) تفاعلات التعادل :

- η للحامض = عدد ايونات الهيدروجين المتأينة H^+ من مول واحد من الحامض .
- η للقاعدة = عدد ايونات الهيدروكسيد المتأينة OH^- من مول واحد من القاعدة .
- η للملح القاعدي = عدد الايونات الموجبة $\times$ تكافؤها .

(2) تفاعلات الترسيب : η = عدد الايونات الموجبة $\times$ تكافؤها

(3) تفاعلات تكوين المعقد :

η (للذرة المركزية) = عدد المزدوجات الالكترونية المكتسبة

η (لليكنند) = عدد المزدوجات الالكترونية الموهوبة من مول واحد من المعادلة

(4) تفاعلات الاكسدة والاختزال : η للعامل المؤكسد (اختزال) = عدد الالكترونات المكتسبة

η للعامل المختزل (اكسدة) = عدد الالكترونات المفقودة

ما الكتلة اللازمة من ثنائي كرومات البوتاسيوم $K_2Cr_2O_7$ ($M = 294 \text{ g/mol}$) لتحضير محلول بحجم $2L$ وتركيز $0.12N$ من هذا الكاشف ليستعمل كعامل مؤكسد بحسب التفاعل التالي ؟ $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6Fe^{2+} \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O + 6Fe^{3+}$

(1) نجد η : $2X + (-2 \times 7) = -2 \Rightarrow 2X = +12 \Rightarrow X = +6$
 $\eta = \text{عدد الالكترونات المكتسبة} = 6 \text{ eq/mol}$ (اي كل ذرة اكتسبت ثلاثة الكترونات)

(2) نجد EM : $EM_{K_2Cr_2O_7} = \frac{M_{K_2Cr_2O_7}}{\eta} = \frac{294 \text{ g/mol}}{6 \text{ eq/mol}} = 49 \text{ g/eq}$

(3) نجد m : $m(g) = N(\text{eq/L}) \times EM(\text{g/eq}) \times V(L)$

$m(g) = 0.12 \text{ eq/L} \times 49 \text{ g/eq} \times 2L = 11.79g$

ما هي مولارية وعيارية محلول هيدروكسيد الباريوم المحضر بإذابة 9.5 g من هذه المادة في $2L$ من المحلول والمستعمل في تفاعل حامض- قاعدة ؟ ($M = 171 \text{ g/mol}$) .

$M = \frac{m(g)}{M(g/mol)} \times \frac{1}{V(L)}$
 $M = \frac{9.5 \text{ g}}{171 \text{ g/mol}} \times \frac{1}{2L} = 0.027 \text{ mol/l}$

$(Ba(OH)_2) \eta = \text{عدد مجاميع الهيدروكسيد} OH^- \text{ المتأينة} = 2 \text{ eq/mol}$

قانون مهم $N = \eta \text{ eq/mol} \times M \text{ mol/L}$

$N = 2 \text{ eq/mol} \times 0.027 \frac{\text{mol}}{L} = 0.054 \text{ eq/l}$

س/ تستعمل برمنغنات البوتاسيوم $KMnO_4$ في تفاعلات التأكسد والاختزال فأذا تفاعلت هذه المادة في محيط متعادل كعامل مؤكسد لينتج MnO_2 ، ما قيمة η لبرمغات البوتاسيوم ؟ وكم هي عيارية محلول هذه المادة الذي تركيزه المولاري يساوي 0.08 mol/L .



$+1 + Mn + (-2 \times 4) = 0$
 $+1 + Mn - 8 = 0$
 $Mn = +7$

$Mn + (-2 \times 2) = 0$
 $Mn = +4$

$\eta = \text{عدد الالكترونات المفقودة} = 3 \text{ eq/mol}$

$N = \eta \text{ eq/mol} \times M \text{ mol/L} = 3 \times 0.08 = 0.24$

احسب مولارية محلول من $Al_2(SO_4)_3$ يشترك في تفاعل الترسيب عيارته $0.3N$

مثال

($\eta = 2 \times 3 = 6$) ، 0.05 mol/L



(1) اذا كان في السؤال مادتين والمطلوب تركيز او حجم احدهما :

حيث n هي عدد مولات المادة من المعادلة الموزونة

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{M \times V}{n} = \frac{M \times V}{n} \end{array} \right. \quad (أ)$$

(ب) $N \times V = N \times V$

(2) اذا كانت مادتين متفاعلتين واعطى في السؤال تركيز وحجم لمادة واحدة (القياسية) فنجد الكتلة او % او M للمادة المجهولة من :

note احياناً نستخدم اكثر من قانون في السؤال الواحد

$$m(g) = N(eq/L) \times V(L) \times EM(g/eq)$$

المادة القياسية
المادة المجهولة

سؤال

تمت معايرة 50 ml من محلول حامض HIO_3 ($M = 176 g/mol$) بالتسحيح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي بتركيز 0.145N ، فاذا علمت ان حجم محلول القاعدة المضاف من السحاحة اللازم للوصول الى نقطة نهاية التفاعل بلغ 45.8 ml احسب التركيز العياري لحامض HIO_3 .

(المادة القياسية) $NaOH$ ($N \times V$) = ($N \times V$) HIO_3 (المادة المجهولة)


$$N \times 50 ml = 0.145N \times 45.8 ml$$

$$N = 0.13 eq/L$$

لمعايرة محلول $NaOH$ وايجاد تركيزه بشكل مضبوط ، تم تسحيح 25 ml منه مع محلول حامض الكبريتيك H_2SO_4 ذو تركيز 0.08 M وكان الحجم المضاف من الحامض اللازم للوصول الى نقطة النهاية هو 47.1 ml . احسب التركيز المولاري لمحلول هيدروكسيد الصوديوم ، ثم جد عدد غرامات $NaOH$ المذابة في 500 ml من هذا المحلول .

سؤال 15

(1) نجد المولارية للقاعدة :



(2) نجد غرامات القاعدة :

$$m(g) = M (mol/L) \times M(g/mol) \times V(L)$$

$$m(g) = 0.3 (mol/L) \times 40(g/mol) \times 500 ml \times \frac{1L}{1000 ml} = 6 g$$

$$\frac{(M \times 25 \text{ ml})_{NaOH}}{2} = \frac{(0.08 \text{ M} \times 47.1 \text{ ml})_{H_2SO_4}}{1}$$

$$M = 0.3 \text{ mol/L}$$

أمثلة 13



تمت معايرة g 1.2 من عينة تحوي حامض الخليك CH_3COOH ($M = 60 \text{ g/mol}$) بالتسحيح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي بتركيز 0.3 N ، فإذا علمت ان حجم محلول القاعدة المضاف من السحاحة للوصول لنقطة نهاية التفاعل بلغ 35 ml . احسب النسبة المئوية للحامض في العينة

$$EM_{CH_3COOH} = \frac{M}{\eta} = \frac{60 \text{ g/mol}}{1 \text{ eq/mol}} = 60 \text{ g/eq} \quad (1) \text{ نجد كتلة } CH_3COOH :$$

$$m(g) = N(\text{eq/L}) \times V(L) \times EM(\text{g/eq})$$

$$m(g) = 0.3 \text{ N} \times \frac{\text{eq}}{L} \times 35 \text{ ml} \times \frac{1L}{1000\text{ml}} \times 60 \text{ g/eq} = 0.63 \text{ g}$$

$$\% CH_3COOH = \frac{m_{CH_3COOH}(g)}{m_{\text{العينة}}(g)} \times 100 \quad (2) \text{ نجد } \% \text{ للحامض :}$$

$$\% CH_3COOH = \frac{0.63 \text{ g}}{1.2 \text{ g}} \times 100 = 52.5 \%$$

مثال 8



في عملية تسحيح حامض الاوكزاليك $H_2C_2O_4$ ($M = 90 \text{ g/mol}$) مع محلول هيدروكسيد الصوديوم تطلب تسحيح g 0.1743 من عينة غير نقية لهذا الحامض إضافة 39.82 ml من 0.09 M من محلول القاعدة للوصول إلى نقطة نهاية التفاعل . احسب النسبة المئوية لحامض الاوكزاليك في العينة .

السؤال هو عملية تسحيح وفيه مادتين متفاعلتين اي حامض وقاعدة (تفاعل تعادل) ،

(1) نحول التركيز المولاري M الى العياري N :

$$NaOH \downarrow \eta = \text{عدد مجاميع الهيدروكسيد } OH^- \text{ المتأينة} = 1 \text{ eq/mol}$$

$$N = \eta \text{ eq/mol} \times M \text{ mol/L} = 1 \text{ eq/mol} \times 0.09 \text{ mol/L} = 0.09 \text{ eq/L}$$

$$H_2C_2O_4 \downarrow \eta = H^+ \text{ عدد ذرات الهيدروجين المتأينة} = 2 \text{ eq/mol} \quad (2) \text{ نجد } EM \text{ للحامض :}$$

$$EM_{H_2C_2O_4} = \frac{M}{\eta} = \frac{90 \text{ g/mol}}{2 \text{ eq/mol}} = 45 \text{ g/eq}$$

$$m(g) = N(\text{eq/L}) \times V(L) \times EM(\text{g/eq})$$

$$m(g) = 0.09 \times 39.82 \text{ ml} \times \frac{1L}{1000\text{ml}} \times 45$$

$$m(g) = 0.16 \text{ g}$$

(3) نجد كتلة الحامض :

$$\% H_2C_2O_4 = \frac{m_{H_2C_2O_4}(g)}{m_{\text{العينة}}(g)} \times 100$$

(4) نجد % للحامض :

$$\% H_2C_2O_4 = \frac{0.16 g}{0.1743 g} \times 100 = 91.8 \%$$

$$Eq H_2C_2O_4 = Eq NaOH$$

الطريقة الثانية:

$$\frac{m}{EM} = N \times V$$

$$\frac{m}{EM} = M \times n \times V$$

$$m = 0.09 \times 1 \times 39.82 ml \times \frac{1L}{1000ml} \times 45$$

$$m(g) = 0.16 g \quad \text{ثم نكمل الحل ...}$$

سؤال

اذيب 4.29 g من بلورات كاربونات الصوديوم المائية $Na_2CO_3 \cdot xH_2O$ في قليل من الماء المقطر ثم اكمل حجم المحلول الى 250 ml فإذا علمت ان 25 ml من المحلول الاخير يحتاج الى 15 ml من محلول HCl عيارته 0.2 N لمكافئته . ما عدد جزيئات الماء (X) في الصيغة الكيميائية لكاربونات الصوديوم المائية ؟

$$Na_2CO_3 \cdot xH_2O (N \times V) = (N \times V) HCl \quad (1) \text{ نجد التركيز العياري للملح :}$$

$$N \times 25 ml = 0.2 N \times 15 ml$$

$$N = 0.12 eq/L$$

$$N = \frac{m(g)}{EM(g/eq)} \times \frac{1}{V(L)}$$

(2) نجد EM للملح من N :

$$0.12 eq/L = \frac{4.29(g)}{EM(g/eq)} \times \frac{1}{250ml} \times \frac{1000ml}{1L}$$

$$EM = 143 (g/eq)$$

(3) نجد M من EM : $2 eq/mol = 1 \times 2 =$ عدد الايونات الموجبة $\times$ تكافؤها η (الملح القاعدي)

$$EM_{Na_2CO_3 \cdot xH_2O} = \frac{M}{\eta}$$

$$143 (g/eq) = \frac{M}{2 eq/mol} \Rightarrow M = 286 g/mol$$

(4) نجد عدد جزيئات الماء (X) من M :

$$(23 \times 2) + (12 \times 1) + (16 \times 3) + 18X = 286$$

$$106 + 18X = 286$$

$$18X = 180$$

$$X = 10 \quad (\text{وهو عدد جزيئات الماء في الملح})$$



اضيف 20 ml من محلول برمنكات البوتاسيوم $KMnO_4$ تركيزه 0.3 N الى كمية وافية من محلول يوديد البوتاسيوم KI المحمض ، فتحررت كمية من اليود I_2 التي تم تسحيحها مع محلول ثايوكبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ ($M = 158\text{ g/mol}$) حسب التفاعل الاتي : $I_2 + 2Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$ حيث استهلك 25 ml من هذا المحلول للوصول الى نقطة نهاية التفاعل ، احسب : أ) عيارية محلول $Na_2S_2O_3$. ب) عدد غرامات ثايوكبريتات الصوديوم المذابة في 1 L من هذا المحلول .

أ) نجد N لـ $Na_2S_2O_3$:


نلاحظ في السؤال ان برمنكات البوتاسيوم تكافئ محلول KI ومحلول KI يكافئ I_2 المتحرر وهو يكافئ محلول ثايوكبريتات الصوديوم ، لذلك فإن محلول البرمنكات يكافئ محلول الثايوكبريتات وكالاتي :

$$Eq\ Na_2S_2O_3 = Eq\ KMnO_4$$

(المادة القياسية) $KMnO_4$ ($N \times V$) = ($N \times V$) $Na_2S_2O_3$ (المادة المجهولة)

$$N \times 25\text{ ml} = 0.3N \times 20\text{ ml}$$

$$Na_2S_2O_3\text{ لـ } N = 0.24\text{ eq/L}$$



ب) نجد كتلة $Na_2S_2O_3$:

$$S_2 = +4$$

$$S_2 = +5$$

فقدان $1e^-$

$$m(g) = N(eq/L) \times V(L) \times EM(g/eq)$$

$$m(g) = 0.24(eq/L) \times 1\text{ L} \times \frac{158\text{ g/mol}}{1\text{ eq/mol}}$$

$$m(g) = 37.92\text{ g}$$

الفصل السابع - الكيمياء العضوية

الهيدروكربونات

وهي مركبات عضوية تحتوي على عنصر الكربون والهيدروجين فقط وتعتبر من أبسط المركبات العضوية

عدد ذرات الكربون	المقطع اللاتيني	الكان (ان)	الكين (ين)
C ₁	ميث	ميثان	
C ₂	ايث	ايثان	ايثين
C ₃	بروب	بروبان	بروبين
C ₄	بيوت	بيوتان	بيوتين
C ₅	بنت	بنتان	بنتين
C ₆	هكس	هكسان	هكسين

اصنافها:

الالكانات:

جميع اواصرها مفردة قوية (اواصر تساهمية) صيغتها العامة (R-H) والقانون العام $(C_n H_{2n+2})$.

الالكانات:

مركبات عضوية تحتوي على اصرة مزدوجة الصيغة العامة لها $(=C=C=)$ والقانون العام $(C_n H_{2n})$.

مجاميع الالكل:

هي المجموعة المتبقية من الالكان بعد حذف ذرة هيدروجين وتكون مرتبطة دائماً بذرة او مجموعة اخرى ، ويستفاد منها في تسمية المركبات العضوية وذلك بحذف المقطع (ان) واستبدالها بالمقطع (يل) .

امثلة : ميثيل - CH_3 ، اثيل - $CH_3 - CH_2$ ، بروبيل - $CH_3 - CH_2 - CH_2$

تسمية الهيدروكربونات حسب التسمية النظامية (IUPAC) :

الصيغة الجزيئية:

وهي الصيغة الكيميائية التي تبين عدد الذرات في المركب الكيميائي مثال ، الايثان C_2H_6 .

الصيغة البنائية (التركيبية) :

وهي الصيغة الكيميائية التي تبين كيفية ترابط الذرات المكونة للمركب مع بعضها في الفراغ ، ويمكن بواسطتها التمييز بين عدة مركبات تشترك في صيغة جزيئية واحدة .

الايزومرات:

وهي عدة مركبات تتشابه في الصيغة الجزيئية وتختلف في الصيغ التركيبية ، ولذلك تكون مختلفة في درجات الانصهار والغليان وفي خواصها الفيزيائية والكيميائية وفي تسميتها .

المجموعة الفعالة:

وهي ذرة او مجموعة ذرات ترتبط بذرة الكربون في المركبات العضوية فتكسب المركب العضوي صفات كيميائية وفيزيائية متماثلة تميزها عن غيرها من المركبات العضوية .



هاليدات الالكيل :

الصيغة العامة: $R - x$ حيث: R - مجموعة الكيل ، x - ذرة هالوجين ($x = Cl, Br, I$)

تسمية هاليدات الالكيل : حسب الطريقة النظامية ايوباك (IUPAC)




- (1) نختار اطول سلسلة مستمرة لذرات الكربون تحوي ذرة الهالوجين ونرقم من الطرف الاقرب للهالوجين
- (2) نذكر رقم ذرة الكربون الحاملة للهالوجين ثم اسم الهالوجين مع إضافة الحرف (و) ثم اسم الالكان المقابل .
- (3) عند وجود اكثر من ذرة هالوجين متشابهة نذكر العدد ثنائي ، ثلاثي ، رباعي ،
- (4) عند وجود اكثر من ذرة هالوجين مختلفة ، فتسمى حسب الابجدية الانكليزية اي (**Bromo** ثم **Chloro** ثم **Iodo**) .
- (5) نسمي فروع مجاميع الالكيل (ان وجدت) حسب الحروف الابجدية الانكليزية وكالاتي :
اثيل (**Eethyl**) ثم مثيل (**Methyl**) ثم برويل (**Propyl**) .
- (6) تسمى فروع الهاليد قبل مجموعة الالكيل .

امثلة حول تسمية الهاليدات :

$\begin{array}{c} Cl \\ \\ CH_3 - CH_2 - CH - CH_3 \end{array}$ 2 - كلورو بيوتان	(1) $CH_3 - Cl$ كلورو ميثان
$\begin{array}{cc} Cl & Br \\ & \\ CH_3 - CH - CH - CH_3 \end{array}$ 2- برومو - 3 - كلورو بيوتان	(2) $CH_3 - CH_2 - Br$ برومو ايثان
$\begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_3 - CH - CH_2 - CH_2 - Br \end{array}$ 1- برومو - 3 - مثيل بيوتان	(3) $\begin{array}{cc} Br & Br \\ & \\ CH_2 - CH_2 \end{array}$ 1 ، 2 - ثنائي برومو ايثان



ارسم الصيغة البنائية لكل مما يأتي :
(أ) 1 ، 1 - ثنائي كلورو إيثان (ب) 2 - برومو 2 - يودو هكسان (ج) 2 - يودو 2 - ميثيل بيوتان




تحضير هاليدات الألكيل : تحضير الهاليدات من إضافة هاليد الهيدروجين إلى الألكين :



(1) الألكينات المتناظرة :
وهي الألكينات التي يكون لذرتي كربون الأصرة المزدوجة نفس المجاميع المرتبطة بهما أي متشابهة .

(1) حضر كلورو إيثان من الأثيلين

مثال 3



(2) الألكينات غير المتناظرة :
وهي الألكينات التي تكون فيها المجاميع المرتبطة بذرتي كربون الأصرة المزدوجة مختلفة ، وتتم إضافة حسب قاعدة ماركوفنيكوف .


قاعدة ماركوفنيكوف :



عند إضافة الكاشف غير المتناظر إلى مركبات الأصرة المزدوجة غير المتناظرة فإن أيون الهيدروجين (الأيون الموجب) من الكاشف يضاف إلى ذرة كربون الأصرة المزدوجة التي تحمل العدد الأكبر من ذرات الهيدروجين وتكوين أيون الكربونيوم الأكثر استقراراً .

(2) حضر بروبان من البروبين .

مثال 3



سؤال



(2018 / ت - الاضافة حسب قاعدة —)



عند اضافة بروميد الهيدروجين الى البروبين ينتج 2 - برومو بروبان وليس 1 - برومو بروبان ، علل ذلك ؟

وذلك لان ايون الكربونيوم 2° (الناتج A) اكثر استقراراً من ايون الكربونيوم 1° (الناتج B) ، وان الاضافة تتم حسب قاعدة ماركوفنيكوف .

أمرين 4





اكتب تفاعل اضافة HCl مرة الى 1 - بيوتين واخرى الى 2 - بيوتين .



أمرين 5



اكتب المعادلة الكيميائية التي تحقق التفاعلات الآتية :
1) تحضير 2 - برومو بيوتان من الكين المناسب (2) اضافة حامض HCl الى 2 - ميثيل بروبين .



الخواص الفيزيائية :



سؤال



لا تذوب هاليدات الالكيل في الماء ولكنها تذوب في المذيبات العضوية ، علل ؟

وذلك لعدم قابليتها على تكوين اواصر هيدروجينية .




الخواص الكيميائية :

1) تفاعل هاليدات الألكيل مع محلول KOH المائي لتعطي الكحول:
حيث يتم استبدال ذرة الهالوجين بمجموعة الهيدروكسيل ($-OH$): (تفاعل استبدال أو تعويض)



2) تفاعل هاليدات الألكيل مع محلول KOH الكحولي لينتج الألكينات: (تفاعل حذف)

حيث يتم حذف ذرة الهالوجين X مع ذرة هيدروجين مجاورة لذرة كاربون الهالوجين لتكوين اصرة مزدوجة (الكين):



(3) التفاعل مع فلز المغنيسيوم لتكوين كاشف كرينيارد : (تفاعل اضافة)

حيث تتفاعل الهاليدات مع فلز المغنيسيوم بوجود الاثير الجاف (الخالى من الرطوبة) لتكوين كاشف كرينيارد والذي يستخدم في تحضير الحوامض الكربوكسيلية لاحقاً بعد مفاعله مع غاز CO_2 وتحلله مائياً :




نمبر 6


وضح بالمعادلة الكيميائية ماذا يحدث عند مفاعلة :

1) محلول هيدروكسيد البوتاسيوم KOH في محلولها المائي مع 2 - كلورو - 2 - ميثيل بروبان .

(2) محلول هیدروکسید البوتاسیوم KOH الکحولی مع 1 - برومو - 3 - ائیل بنتان .



2 - 2 - کلورو - متیل پروپان



1 - برومو - 3 - ائیل بنتان



وهي مركبات عضوية تكون فيها مجموعة هيدروكسيل مرتبطة بذرة كاربون مشبعة (OH) .

صيغتها العامة : $R - OH$ ، قانونها العام : $C_nH_{2n+2}O$


تسمية الكحولات : حسب الطريقة النظامية ايوباك (IUPAC) .

(1) اختيار اطول سلسلة كاربونية مستمرة تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل OH ونرقم السلسلة من الطرف الاقرب لـ OH .

(2) نسمي الفروع اولاً (ان وجدت) بذكر الهالوجينات ثم مجاميع الالكيل .

(3) نسمي الكحول بأضافة المقطع (ول) الى نهاية الالكان ليصبح (الكانول) وكما في الامثلة الاتية :


1 - بروبانول




2 - بروبانول



3 - كلورو - 1 - بروبانول



2 ، 2 ، 4 - ثلاثي مثيل - 3 - ببتانول



مثال 4



ما هي الصيغ البنائية المحتملة للكحولات ذوات الكتلة المولية ($74g/mol$) علماً ان الكتل الذرية هي : ($O = 16$ ، $C = 12$ ، $H = 1$) .

القانون العام للكحولات هو $C_nH_{2n+2}O$ حيث نجد n (عدد ذرات الكربون) من الكتلة المولية للقانون العام :

$$M_{C_nH_{2n+2}O} = 74g/mol$$

$$(12 \times n) + 1 \times (2n + 2) + (1 \times 16) = 74$$


$$12n + 2n + 2 + 16 = 74$$

$$14n = 56$$

$$n = 4$$

∴ الكحول هو $C_4H_{10}O$

والصيغ البنائية المحتملة (المتجانسات) هي كالآتي :





تحضير الكحولات :



تحضر الكحولات بعدة طرق ومنها الطريقة المختبرية وهي :
إضافة جزيء الماء الى الالكين : بوجود حامض الكبريتيك H_2SO_4 المركز الساخن


أمثلة 9 حضر : (1) 2 - بيوتانول من 1 - بيوتين (2) الايثانول من الاثيلين



الخواص الفيزيائية :

- لها درجات غليان عالية نسبة الى الالكانات المقابلة ، علل ذلك ؟
بسبب قابلية الكحولات على تكوين اواصر هيدروجينية بينية بين جزيئاتها .
- تمتزج الكحولات من ($C_3 - C_1$) بشكل تام مع الماء (اي تذوب في الماء) علل ذلك ؟
بسبب قابلية الكحولات على تكوين اواصر هيدروجينية مع الماء .

(1) تفاعل الكحولات مع فلز الصوديوم او البوتاسيوم مكونة الكوكسيدات وتحرر غاز H_2





(2) كيف تميز بين 1 - بنتانول والبنتان ؟

سؤال 13




وذلك بالتفاعل مع فلز Na وتحرر غاز H_2 مع الكحول اما البنتان فلا يتفاعل او بتفاعل الأكسدة :



دليل حصول التفاعل
هو تحرر فقاعات

(2) تفاعل الكحولات مع خماسي كلوريد الفسفور PCl_5 وثلاثي كلوريد الفسفور PCl_3 لتكوين هاليدات الالكيل :



(3) تفاعل الكحولات مع هاليد الهيدروجين (HX) لتكوين هاليدات الالكيل :


كاشف لوكاس : هو محلول كلوريد الزنك ($ZnCl_2$) المذاب في حامض الهيدروكلوريك المركز .

اهميتة : يستخدم للتمييز بين انواع الكحولات حيث تتفاعل الكحولات الثلاثية مباشرة مع الكاشف (HCl) مكونة عكرة في المحلول نتيجة لتكون هاليد الالكيل غير الذائب ، اما الكحولات الثانوية فيستغرق التفاعل (2 - 5) دقائق لغرض تكوين العكرة ، اما الكحولات الاولى فلا تتفاعل .


مثال 5

میز کیمیائیاً بین 1 - بروبانول و 2 - بروبانول و 2- مثل - 2 - بروبانول ؟

وذلك بأستخدام كاشف لوكاس حيث الكحول الذي لا يتفاعل فهو الكحول الاول اي 1-بروبانول ، اما الكحول الذي يتأخر بعد مرور (2 - 5) دقيقة فهو الكحول الثانوي اي 2 - بروبانول ، اما الذي يتفاعل مباشرة مكوناً عكرة فهو كحول ثالثي اي 2 - ميثيل - 2 - بروبانول ، وكما في التفاعلات الآتية :



(4) نزع او سحب جزيئة الماء من الكحولات لتكوين الالكينات :



مثال :


قاعدة سنسيف الحذف:

الايون الموجب يسحب من ذرة الكربون الحاملة اقل عدد من ذرات الهيدروجين المجاورة لذرة الكربون التي يسحب منها الايون السالب . (اي عكس قاعدة ماركوفينيكوف للاضافة)

مثال 10

عند سحب جزء ماء من 2 - بيوتانول يكون الناتج 2- بيوتين وليس 1- بيوتين ،
علل ؟

السبب هو لان حذف الماء حسب قاعدة ستيفنسون للحذف (نذكر نص القاعدة) وحسب التفاعل التالي :





يمكن أكسدة الكحولات بأحد العوامل المؤكسدة وهي مزيج من $KMnO_4/H_2SO_4$ او $K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$ وكالاتي :

أ (الكحول الاولي (1^o): تتأكسد الكحولات الاولية الى الالديهايدات اولاً ثم تتأكسد الى الحامض الكربوكسيلي .

ب (الكحول الثانوي (2^o): تتأكسد الكحولات الثانوية الى الكيتونات .

ب (الكحول الثالثي (3^o): لا تتأكسد الكحولات الثالثية بالعوامل المؤكسدة ،

تمرين 11




ما ناتج الأكسدة التامة للمركبات الآتية :


(1) 1 - بيوتانول (2) 2 - بيوتانول (3) 2 - ميثيل - 2 - بروبانول

(2017 / د 3 - 1 بروبانول)


(1) 1 - بيوتانول



(2) 2 - بيوتانول



(3) 2 - ميثيل - 2 - بروبانول



علل ؟ (2017 / د 3 - موصل) لا يحدث تفاعل 2 - ميثيل - 2 - بروبانول (كحول ثالثي)

الايثرات :



هي مركبات عضوية تحتوي على ذرة اوكسجين مرتبطة بمجموعتي الكيل .

صيغتها العامة : $R-O-R'$

القانون العام : $C_nH_{2n+2}O$

المجموعة الوظيفية : $C-O-C$

تسمية الاثيرات : حسب الطريقة النظامية ايوباك (IUPAC) ملخص التسمية : كوكسي الكان

(1) نختار اطول سلسلة من مجموعتي الالكيل (المجموعة الاكبر) ونعتبرها السلسلة الام وتعطى اسم الالكان المقابل .

(2) نرقم السلسلة الام من الطرف الاقرب لذرة الكربون المرتبطة بذرة الاوكسجين .

(3) نعتبر الطرف المتبقي (الفرع الاصغر R - O) تفرعاً ويأخذ اسم الكوكسي وحسب نوع مجموعة الالكيل وكالاتى :


ميثوكسي $CH_3 - O$

ايثوكسي $CH_3CH_2 - O$

بروبوكسي $CH_3CH_2CH_2 - O$

(4) نكتب موقع واسم التفرعات - المتصلة بالسلسلة الام - ان وجدت .

مثال 6 اكتب الاسم النظامي للمركبات الاتية :



2- ميثوكسي بروبان 2- كلورو ميثوكسي بروبان 2- ايثوكسي بيوتان

(بطريقة وليمسون)

تحضير الاثيرات :

(1) مفاعلة فلز الصوديوم مع كحول مناسب لتكوين الكوكسيد الصوديوم .

(2) مفاعلة الكوكسيد الصوديوم مع هاليد الالكيل المناسب لتكوين الايثر المطلوب .

تمرين 14 اكتب معادلة تحضير ايثوكسي بيوتان من الايثانول

(2018 د 2 - حضر ايثوكسي بروبان)

(1) من الايثانول يحضر جزء الكوكسي ومن الهاليد يحضر جزء البيوتان :



ايثوكسيد الصوديوم

كلورو بيوتان

ايثوكسي بيوتان

واجب

حضر میثوکسی ایٹان من کحول مناسب .

الخواص الفيزيائية :

سؤال

للايثرات درجات غليان اوطأ من درجة غليان الكحولات المناظرة ، علل ؟

بسبب عدم قدرة الاثرات على تكوين اواصر هيدروجينية بينة بين جزيئاتها .

سؤال


الايثرات قليلة الذوبان في الماء عل ؟

ج/ بسبب عدم قابليتها على تكوين اواصر هيدروجينية مع جزيئات الماء عدا تلك التي تمتلك مجاميع الكيل صغيرة فهي ذائبة في الماء .


الخواص الكيميائية :

1) تفاعل الايثرات مع حامض الكبريتيك :

أ) تفاعلها مع حامض الكبريتيك المخفف الساخن لتعطي الكحولات :



(ب) تفاعلها مع حامض الكبريتيك المركز البارد لتعطي املاح الاوكسونيوم :
حيث تهب الايثرات زوج من الالكترونات الى ايون الهيدروجين الموجب (الناتج من الحامض) لتكوين ملح الاوكسونيوم :




ملاحظة: يستخدم التفاعل (أ) للتمييز بين الايثرات والالكانات ، حيث لا تتفاعل الالكانات مع الحوامض المركزة ولا مع المخففة .

سؤال

کیف تمیز کیمیائاً بین میٹوکسی میٹان والیٹان ؟

ج/ عند معاملة ميثوكسي ميثان مع حامض الكبريتيك المخفف بالتسخين يعطي كحول الميثانول اما الايثان فلا يتفاعل لانه كان :





(2) تفاعل الايثرات مع PCl_5 لتكوين كلوريدات الالكيل :



ايثوكسي ايثان

خماسي كلوريد الفسفور

كلورو ايثان

الالديهيدات والكيثونات



تتشترك الالديهيدات والكيثونات في مجموعة وظيفية واحدة هي مجموعة الكربونيل ، وتكون طرفية في الالديهيدات ، وقانونها العام $C_nH_{2n}O$.

تسمية الالديهيدات : حسب الطريقة النظامية ايوباك (IUPAC)



- (1) نختار اطول سلسلة كربونية تحتوي على مجموعة الكربونيل .
- (2) اذا كان الالديهيد لا يحمل تفرعات يسمى (الكان + ال) اي الكانال .
- (3) اذا كان الالديهيد يحمل تفرعات ، نرقم من طرف مجموعة الكربونيل بحيث تأخذ ذرة كربون الكربونيل رقم 1 دائماً .

رقم التفرع + اسم التفرع + الكانال

تسمية الكيثونات :




- (1) نختار اطول سلسلة كربونية تحتوي على مجموعة الكربونيل ونرقم من الطرف الاقرب للكربونيل .
- (2) اذا كان الكيتون لا يحمل تفرعات يسمى (الكان + ون) اي الكانون .
- (3) اذا كان الكيتون يحمل تفرعات ، نرقم من الطرف الاقرب لمجموعة الكربونيل وكالاتي :


رقم التفرع + اسم التفرع + رقم ذرة كربون + الكانون
مجموعة الكربونيل

(1) اكتب الاسم النظامي لكل مما يأتي :

سؤال




3- كلورو بيوتانال






(2) ارسم الصيغة البنائية لكل مما يأتي :



(أ) 3- ميثيل بيوتانال




(ب) 2- هكسانون

تحضير الالديهيدات :



تحضر الالديهيدات من اكسدة الكحولات الاولية (1°) اكسدة غير تامة بأستخدام محلول حمض لثنائي كرومات البوتاسيوم $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ او البرمنغنات KMnO_4 :




مثال :

تحضير الكيتونات :




تحضر الكيتونات من اكسدة الكحولات الثانوية (2°) بأستخدام محلول حمض لثنائي كرومات البوتاسيوم $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ او البرمنغنات KMnO_4 :




مثال :

ما ناتج الاكسدة التامة للمركبات الاتية : (1) 1- بروبانول (2) 2- بنتانول

سؤال





(1)



(2)



حضر كلاً من المركبات التالية باستخدام كحول مناسب : (1) إيثانال (2) -2 بيوتانول





الخواص الكيميائية :





(1) اختزالها بالهيدروجين الى الكحولات :

حيث يتم اختزال الالديهيدات الى الكحولات الاولى ، والكيتونات الى الكحولات الثانوية ، وذلك بمعاملتها مع H_2 بوجود عنصر البلاتين Pt او النيكل Ni :





(2) الاختزال الى الالكانات :

تتضمن هذه الطريقة استخدام ملغم (الزئبق - خارصين) في حامض HCl كعامل مختزل ، وتسمى طريقة اختزال كلمنسون :





(3) التفاعل مع الهيدرازين :

تتفاعل الالديهيدات والكيئونات مع الهيدرازين (NH_2NH_2) لتعطي الهيدرازون ، وهي مركبات **صفراء** او **برتقالية** وتدعى ايضاً بقواعد شيف يستخدم التفاعل اعلاه للتعرف على وجود مجموعة الكربونيل للالديهيد او الكيتون :



سؤال

(1) حضر البروبان من البروبانال (2) اكتب تفاعل اضافة الهيدرازين الى البروبانال .



(4) الاكسدة :

وهي من ابرز التفاعلات التي يمكن حدوثها للالديهيدات دون الكيئونات ، حيث تتأكسد الالديهيدات الى الحامض العضوي المقابل في حين لا يستجيب الكيتون لعملية الاكسدة ، والسبب يعود لعدم وجود ذرة هيدروجين مرتبطة في ذرة كاربون الكربونيل في الكيئونات ووجودها في الالديهيدات .

اهميته : يستخدم تفاعل الاكسدة اعلاه للتمييز بين الالديهيدات والكيئونات وحسب التفاعلات الاتية :

(1) كاشف تولن :





وهو محلول هيدروكسيد الفضة الامونياكي $Ag(NH_3)_2OH$ ، حيث تترسب الفضة على جانبي الانبوبة وعلى هيئة مرآة فضية مميزة جداً ، دلالة على وجود الالديهيد بينما لا تتفاعل الكيئونات مع هذا الكاشف .

(2) كاشف فهلنك :


وهو محلول لملاح كبريتات النحاس (II) القاعدية أزرق اللون ، ويستخدم لأكسدة الألددهايد حيث تختزل نتيجة لذلك أيونات النحاس (II) إلى راسب أو أكسيد النحاس (I) الأحمر والذي يستدل منه على وجود مجموعة الألددهايد بينما الكيتونات لا تتفاعل مع الكاشف .

سؤال

كيف تميز عملياً بين مركب البروبانال والبروبانون باستخدام :
(1) محلول فهلنك (2) كاشف تولن





: الحوامض الكربوكسيلية Carboxylic acid




التسمية :

(1) نختار أطول سلسلة كربونية تحتوي على مجموعة الكربوكسيل $(-COOH)$ وتعطى اسم الألكان المقابل .

(2) عند وجود التفرعات نرقم من طرف الكربوكسيل بحيث تعطى ذرة كربون الكربوكسيل دائماً رقم (1)




(2) يحضر حامض البروبانويك من الاكسدة التامة للبروبانال ، وذلك لان عدد ذرات الكربون متساوي لكل منهما :



سؤال حضر حامض البيوتانويك من كحول البيوتانول ؟

ج/ بما ان عدد ذرات الكربون متساوية لكل من الحامض والكحول لذا فالطريقة هي بالاكسدة التامة للكحول :




سؤال مبتدأ بالايثانال حضر حامض البروبانويك ؟

بما ان عدد ذرات الكربون غير متساوي لذلك نستخدم طريقة كاشف كرينيارد وكالاتي :



ملخص :



- 4) $CH_3CH_2 - MgCl + CO_2 \longrightarrow CH_3CH_2COO - MgCl$
كاشف كرينيارد مركب وسطي
- 5) $CH_3CH_2COO - MgCl + HCl \xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2COOH + MgCl_2$
مركب وسطي حامض البروبانويك

مبتدئاً من بكلوريد الاثيل حضر حامض البروبانويك .

سؤال



- 1) $CH_3CH_2 - Cl + Mg \longrightarrow CH_3CH_2 - MgCl$
- 2) $CH_3CH_2 - MgCl + CO_2 \longrightarrow CH_3CH_2COO - MgCl$
- 3) $CH_3CH_2COO - MgCl + HBr \xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2COOH + MgCl_2$

الخواص الكيميائية :




(1) حامضية الحوامض الكربوكسيلية :

تكتسب الحوامض الكربوكسيلية صفة حامضية ، علل ذلك ؟
وذلك لقابليتها على فقدان بروتون مجموعة الكربوكسيل مما يمكنها على التفاعل مع بسهولة مع القواعد لتكوين ملح وماء .



(2) تفاعل الحوامض مع الكربونات والبيكربونات :

حيث تتفاعل الحوامض مع الكربونات والبيكربونات محررة غاز CO_2 .



اكتب معادلة تفاعل حامض الخليك مع بيكربونات الصوديوم $NaHCO_3$.

سؤال



ملاحظة : يستخدم التفاعل اعلاه للكشف عن الحوامض الكربوكسيلية من خلال تحرر غاز CO_2 .




كيف تميز مختبرياً بين : البيوتانال وحمض البيوتانويك

من خلال تفاعل الحامض مع كربونات الصوديوم حيث الحامض يتفاعل ويحرر غاز CO_2 والالديهيد لايتفاعل :



حامض البيوتانويك


بيوتانات الصوديوم



بيوتانال

(3) تفاعل الحوامض مع الكحولات (الاسترة) : (يستخدم في تحضير الاسترات)

وهو تفاعل الحامض الكربوكسيلي مع الكحول مع الكحول بوجود حامض لاعضوي كعامل مساعد مثل HCl او H_2SO_4 لتكوين الاستر المقابل والماء وهو تفاعل انعكاسي :



حامض الايثانويك


ميثانول

استر

ماء

(4) اختزال الحوامض الكربوكسيلية :

$LiAlH_4$ لتعطي الكحولات الاولى ، لكنها لا تختزل بأستخدام H_2/Ni ، كما في المثال الاتي :



حامض الايثانويك

كحول الايثانول

الاسترات :



وهي مركبات عضوية مشتقة من الحوامض الكربوكسيلية تشترك معها بوجود الجزء $R - COO -$ ولكن يكمن الاختلاف بينهما في الجزء المرتبط بذرة الاوكسجين ففي الاستر تكون $R^{\backslash}$ ، اما في الحوامض فتكون ذرة هيدروجين .



قانونها العام : $C_nH_{2n}O_2$


تسمية الاسترات :




تسمى الاسترات بتقسيم جزيئة الاستر $R - \overset{O}{\underset{||}{C}} - OR'$ الى قسمين احدهما مشتق من الحامض $R - COO$ ، والاخر مشتق من الكحول R' وكالاتي : (الكيل الكانوات)

- (1) نسمي اولاً جزء الكحول (R') بأعطاه اسم الالكيل المقابل .
- (2) نسمي جزء الحامض بعد اضافة المقطع (ات) الى الالكان المقابل وتسمية الفروع ان وجدت بترقيم ذرة كاربون الكاربونيل برقم (1) ، اي (الكيل الكانوات) .

سؤال (1) اكتب الاسم النظامي لكل مما يأتي :




مثيل ميثانوات



اثيل - 2 - مثيل بروبانات

- (2) بروبييل - 2 ، 3 - ثنائي مثيل هكسانوات :



تحضير الاسترات :





- (1) تفاعل الحامض العضوي (الكاربوكسيلي) مع الكحول لتكوين الاستر (راجع تفاعل الاسترة في تفاعلات الحوامض العضوية)
- (2) تفاعل كلوريد الحامض الكاربوكسيلي مع الكحول بوجود البيردين .


سؤال (1) مبتدئاً بالميثانول حضر اثيل ميثانوات :



اكسدة كحول الميثانول اكسدة تامة ليعطي حامض الميثانويك ، ثم مفاعلة الحامض مع كحول الايثانول لينتج الاستر :



سؤال (3) مبتدئاً بكلوريد الاستيل حضر اثيل ايثانوات :



سؤال

مبتدئاً من الايثانول حضر اثيل ايثانوات $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ واي مواد غير عضوية او عضوية مناسبة



الخواص الفيزيائية :

سؤال درجة غليانها اقل من درجة غليان الحوامض المقابلة لها ، علل ذلك ؟

لانه لا يمكنها ان تكون اواصر هيدروجينية بينية بين جزيئاتها كما في الحوامض او الكحولات


سؤال لا تذوب في الماء علل ذلك ؟

عدم قابليتها على تكوين اواصر هيدروجينية مع الماء ، ولكنها تذوب في اغلب المذيبات العضوية .

الخواص الكيميائية :

(1) التحلل المائي للاستر في محيط حامضي :


حيث يتفاعل الاستر مع الماء بوجود عامل مساعد مثل HCl ليعطي الحامض الكاربوكسيلي والكحول وهو تفاعل انعكاسي . (2016/د-1 خ-ق- اثيل بروبانوات)



(2) التحلل المائي للاستر في محيط قاعدي :


اي تفاعل الاستر مع القواعد مثال $NaOH$ بوجود الماء لينتج ملح الحامض الكربوكسيلي والكحول ، وهو تفاعل غير انعكاسي .

مثال :



سؤال

اكتب تفاعلات التحلل المائي لاثيل ميثانوات مرة في وسط حامضي واخر في وسط قاعدي .



الامينات :



وهي مركبات عضوية من مشتقات الامونيا حيث تحل مجموعة الكيل واحدة او اكثر محل ذرة هيدروجين او اكثر من الامونيا

تسمية الامينات :

اي الاكيل فرع والامين الام


الكيل امين

(ولها ثلاث حالات) التسمية الشائعة:


(1) اذا كانت مجموعة الكيل واحدة ، نذكر اسم المجموعة ثم كلمة امين :



(2) اذا كانت مجموعتين او ثلاث مجاميع الكيل متشابهة (مرتبطة بذرة N) ، فتضاف كلمة ثنائي او ثلاثي واسم المجموعة ثم كلمة امين :




(3) اذا كانت مجموعتين او ثلاث مجاميع الكيل مختلفة ، فتسمى حسب الحروف الابدجية الانكليزية وكالاتي :
اثيل (Ethyl) ثم ايزوبروبيل (Isopropyl) ثم ميثيل (Methyl) ثم بروبييل (Propyl) .



تحضير الامينات : وتحضر بطريقتين




(1) تفاعل الامونيا مع هاليدات الالكيل : مثال :



حضر اثيل امين من هاليد الكيل مناسب : (2013 د 2 - من كلوريد الاثيل)

سؤال




طريقة تحضير الامينات من هاليدات الالكيل غير ناجحة مختبرياً ، علل ذلك ؟

سؤال




وذلك لان الناتج عبارة عن مزيج من امينات اولية وثانوية وثالثية وحيث يصعب فصلها عن بعضها البعض

(2) تفاعل الكحولات الامونيا : مثال :



حضر بروبييل امين باستخدام كحول مناسب ؟

سؤال



طريقة تحضير الامينات من الكحولات ناجحة مختبرياً ، علل ذلك ؟

سؤال




ولكن عند استخدام زيادة كبيرة من الامونيا يمكن الحصول على الامين الاولي فقط



(1) تعتبر الامينات قواعد (اي تتفاعل مع الحوامض) : بسبب وجود المزدوج الالكتروني غير المشترك لذرة النتروجين (NH_3) والذي يكون اصرة جديدة مع البروتون او مع حوامض لويس ، علل ذلك ؟



(2) تفاعل الامينات مع كلوريدات الحامض (الاسيلة) ، لتكوين مركبات عضوية تسمى الاميدات :




استنتج الصيغ البنائية للمركبات العضوية A و B و C و D و E في مخطط التفاعلات التالية اذا علمت ان A مركب عضوي يحوي على ثلاث

سؤال



ذرات كاربون : $A \xrightarrow{HCl} B \xrightarrow[Mg]{\text{ايثر جاف}} C \xrightarrow{CO_2} D \xrightarrow{HCl} E$

ج/ من المعادلة نستنتج ان المركب A الكين ، والمركب B هاليد الكيل ، والمركب C كاشف كرينيارد ، والمركب D مركب وسطي و E حامض كاربوكسيلتي وكالاتي:



الكربوهيدرات:



وهي مركبات عضوية تحتوي على عنصر الكربون والهيدروجين والأكسجين وفيها نسبة الأكسجين مرتفعة ولها الصيغة التركيبية $(CH_2O)_n$ أو $C_n(H_2O)_n$ أي كل ذرة كربون مرتبطة بجزيئة ماء لذلك سميت كربوهيدرات وهي مشتقة من كربون وماء (هيدرات)

اصناف الكربوهيدرات :



- (1) الكربوهيدرات احادية التسكر (سكريات احادية) مثال الكلوكوز والفركتوز .
- (2) الكربوهيدرات ثنائية التسكر (سكريات ثنائية) مثال السكروز المالتوز والمالتوز
- (3) الكربوهيدرات متعددة التسكر (سكريات متعددة) كالنشأ والسيليلوز .

(1) الكربوهيدرات احادية التسكر :

وهي من ابسط انواع الكربوهيدرات وصيغتها الجزيئية $C_6H_{12}O_6$ ، مثال **سكر الكلوكوز** **والفركتوز**

سؤال



يُعد سكر الفركتوز من السكريات المختزلة ، علل ؟ (من اسئلة الفصل)

سبب قابلية الفركتوز للتأكسد على العكس من الكيتونات ، حيث يتأكسد بمحلول فهلنك او تولن ، اما الكيتونات فلا تتأكسد .

(2) الكربوهيدرات ثنائية التسكر (الثنائية) :

وهي الكربوهيدرات التي تتكون من ارتباط جزيئين من السكر الاحادي متماثلتين او مختلفتين بعد فقدان جزيئة ماء ، مثال السكروز والمالتوز الذي يتكون من جزئ كلوكوز وجزئ فركتوز مرتبطين ببعضهما بأصرة كلايوكسيدية وله الصيغة الجزيئية $C_{12}H_{22}O_{11}$

(1)الكربوهيدرات متعددة التسكر :

النشأ : وهو من الكربوهيدرات متعددة التسكر جزيئاتها تنشأ من وحدات من الكلوكوز يتم ترابطها من خلال فك الاصرة الثنائية في الكربونيل وتكوين بوليمر من جزيئات الكلوكوز ، مثال البطاطا .

الكشف عن النشأ : وذلك بأضافة قطرات من محلول النشأ المائي الى محلول اليود في يوديد البوتاسيوم وظهور اللون الازرق دلالة على ان المادة المضافة هي النشأ .


البروتينات:



وهي مركبات عضوية معقدة تتكون من ارتباط اعداد كبيرة من الاحماض الامينية بالواصر الاميدية (**الببتيدية**) بعد فقدها جزيئة ماء وتتكون البروتينات من عنصر الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين واحياناً عنصر الكبريت والفسفور .

اهميتها : تساهم في بناء انسجة المخلوقات الحية حيث تدخل في تركيب جميع الخلايا الحية .

سؤال يصعب فصل البروتينات بطرق كيميائية بسيطة ، علل ذلك ؟
ج/ وذلك نظراً لتشابه تركيبها الكيميائي وصفاتها الفيزيائية والكيميائية .



الاحماض الامينية :

وهي الوحدة الاساسية لبناء البروتين ،
وتختلف الاحماض الامينية فيما بينها بمجموعة
الالكيل ، وعددها عشرون حامض اميني ،
وتمثل بالصيغة البنائية العامة الاتية :

سؤال ما المجموعتان الوظيفيتان التي تشترك فيها جميع الاحماض الامينية ؟

(1) مجموعة الكربوكسيل ($-\text{COOH}$) (2) مجموعة الامين ($-\text{NH}_2$)

سؤال ما الاثر الكيميائي لكل مجموعة على صفات الحامض الاميني ؟

الحامضية بسبب مجموعة ($-\text{COOH}$) ، والقاعدية بسبب مجموعة ($-\text{NH}_2$) .

تمرين 1

علل ان البروتينات مواد ذات صفات حامضية - قاعدية (مواد امفوتيرية) او لماذا تتفاعل
البروتينات مع الحوامض والقواعد .

و ذلك لانها تتفاعل مع الحوامض والقواعد بسبب ان احد طرفي البروتين عبارة عن مجموعة
كربوكسيل الحامضية التي تتفاعل مع القواعد والطرف الاخر مجموعة الامين القاعدية التي
تتفاعل مع الحوامض .

اشكال البروتينات :

- 1) بروتينات تتخذ شكلاً خيطياً (ليفياً) كما في الكرياتين في الشعر والصوف .
- 2) بروتينات شبه كروية كما في البيض .

وظائف البروتينات :

تقوم البروتينات بوظائف اساسية في اجسام المخلوقات الحية وتعتمد الى حد كبير على
الشكل العام للجزيئات (نوع مكوناتها وتركيبها) واي تأثير يغير من الشكل العام
للبروتينات يعطلها عن عملها .

امثلة عن البروتينات : الانزيمات ، الهرمونات ، الهيموغلوبين في الدم .

وهي صنف من البروتينات موجودة في جميع خلايا جسم الكائن الحي كعوامل مساعدة عضوية تتكون داخل الأجسام الحية وتعمل بصورة مستقلة ولها فاعلية في العمليات الحيوية كالهضم والتمثيل الغذائي و عملية التنفس

وظائفها (عملها) : تعمل كعوامل مساعدة للتقليل من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل (اي تقلل من طاقة التنشيط) .

خواصها :

- (1) تتلف بالحرارة
- (2) تعمل ضمن نطاق PH معين
- (3) تتجدد باستمرار لانها تفقد فاعليتها بمرور الزمن ، علل .
- (4) لها فاعلية في العمليات الحيوية كالهضم والتمثيل الغذائي و عملية التنفس .
- (5) تتكون داخل جسم الكائن الحي وتعمل بصورة مستقلة
- (6) لها مضادات توقف عملها .
- (7) موجودة في جميع خلايا الجسم كعوامل مساعدة .

انواعها :

- (1) **الانزيمات الداخلية :**
وتعمل داخل الخلية نفسها وليس لها القابلية على التنافذ خلال غشاء معين مثل الانزيمات التأكسدية .
- (2) **الانزيمات الخارجية :**
ويكون عملها خارج الخلية (اي بعد افرازها من الانسجة) مثل الانزيمات الهاضمة .

الدهون : انواعها :



- (1) **الزيوت النباتية :**
توجد في بذور النباتات مثل القطن والذرة والسمسم وفي بعض الثمار مثل الزيتون وجوز الهند .
- (2) **الشحوم الحيوانية :** وتوجد في جميع خلايا جسم الكائن الحي .

اهميتها :

- (1) تعد المادة الاساس التي يخزنها الجسم للحصول على الطاقة عند الحاجة ، حيث هضمها واكسدتها يؤدي الى تحرر كميات كبيرة من الطاقة ، حيث تمثل الطاقة الكامنة المخزونة في جسم الكائن الحي .
- (2) لها اهمية اقتصادية حيث تدخل في صناعة الصابون والاصباغ والشموع .

(2013 / ت)

خواصها :

(1) لا تذوب في المذيبات القطبية كالماء ، لكنها تذوب في المذيبات العضوية كالاثير والكلوروفورم $CHCl_3$

(2) تكون الدهون (الزيوت والشحوم) ذات ملمس دهني .

(3) تكون الزيوت النباتية سائلة في درجة حرارة الغرفة اما الشحوم فتكون صلبة .

تركيبها : الدهون عبارة عن الاستر الثلاثي للجليسرول مع الحوامض الشحمية والتي تتكون من سلسلة هيدروكربونية طويلة $(C_{24} - C_{12})$ ولها مجموعة كاربوكسيلية طرفية ، ويدعى هذا التركيب بثلاثي الكليسيرايد .

الصابون : هو ملح الصوديوم او البوتاسيوم لحامض دهني .



علام يتوقف عمل الصابون في عملية الصوبنة ؟

سؤال



ج/ يتوقف عمل الصابون الناتج من عملية الصوبنة على نوع القاعدة المستخدمة ونوع الزيت او الدهن

حيث استخدام $NaOH$ ينتج الصابون الصلب وهو الصابون العادي ، اما استخدام KOH فينتج الصابون الطري او السائل المستخدم في الغسيل او كريم الحلاقة .

علام تتوقف جودة الصابون ؟

سؤال



نوع الدهون المستخدمة .

تمرين 2



لماذا لا يستخدم الكالسيوم او المغنيسيوم بديلاً عن الصوديوم او البوتاسيوم في صناعة الصابون ؟

لان ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم من مسببات العسرة للماء فلا يرغو الصابون بالماء عند وجود تلك الايونات فيه لذا لا يمكن استخدام هذين العنصرين .

المراجعة المركزة

عندما يجتمع العلم مع الخبرة، تكون **النتيجة خلاصة الكيمياء** للأستاذ **حبيب الجنابي** مفتاحك للتفوق ! أقوى مراجعة مركزة في العراق! مع أسلوبه المميز في التوضيح والتنظيم، ستجد كل ما تحتاجه للتركيز على النقاط الأساسية والاستعداد لأعلى الدرجات. خذ خطوة نحو النجاح مع هذه المراجعة التي تضمن لك فهماً ومراجعة شاملة، في 2023، قادت الطلاب إلى **140 من 142**، وفي 2024 حققت **137 من 140**، انها الأداة المثالية لتحقيق التفوق الدراسي ! إذا كنت تبحث عن التفوق، فلا تبحث بعيداً ، هنا تبدأ رحلتك نحو القمة! لا تفوت الفرصة لتحقيق أعلى الدرجات مع المراجعة المركزة للأستاذ حبيب الجنابي .



امسح الباركود للانضمام
الى قناة التليگرام



دار الازل للطباعة والنشر

0 7 7 4 7 7 6 6 5 5 5



2025020

10.000 دينار